

Catálogo del herbario de los botánicos cordobeses

Rafael de León y Gálvez, Fr. José de Jesús Muñoz
Capilla, Rafael Entrenas y Antonio Cabrera

Por **DIEGO JORDANO** y **MANUEL OCAÑA** *

Introducción

Este herbario se conserva en la cátedra de Biología de la Facultad de Veterinaria de Córdoba. Los familiares del P. Muñoz Capilla debieron donarlo a mediados del siglo XIX, años después de la creación de este centro de enseñanza. En 1947, el Profesor A. Cabañero, Director del Jardín Botánico de Madrid, encomendó a Diego Jordano la revisión del herbario y la publicación de un catálogo, porque suponía que, dadas las relaciones que hubo entre Muñoz Capilla y Mariano Lagasca, sería probable encontrar datos y ejemplares de valor, y acaso tipos, del más ilustre de los botánicos españoles.

G. Bellido rompió la ordenación linneana y reagrupó los pliegos según la clasificación de De Candolle, hace unos veinticinco o treinta años. Por eso y por el mal estado de conservación en que se encontraba hubimos de acometer la tarea de restaurarlo y darle el orden primitivo.

En las primeras páginas de este catálogo se encontrarán datos de los botánicos cordobeses que intervinieron con aportaciones de muy diversa importancia, y se hace declaración expresa del auxilio recibido de don Mariano Lagasca, de puño y letra de Muñoz Capilla.

Los números marginales corresponden a la numeración de los pliegos. Marcamos la terminación de cada renglón con /. Todo cuanto no figura en el herbario y se debe a nuestra pluma va incluido entre corchetes. p. ej.: [tachado].

Varios discípulos del Laboratorio de Biología nos han ayudado considerablemente a restaurar, reordenar y fichar; entre otros: A. Ca-

(*) Laboratorio de Biología. Facultad de Veterinaria, Córdoba (España).

sado (†), J. Carranza, J. Pérez Aragón, G. Díaz Acedo, D. Dueñas, F. Crespo Hidalgo, L. Ramírez Martínez y A. de Cáceres. A todos ellos expresamos aquí nuestro agradecimiento.

Especies críticas o nuevas

Veinte y tres ejemplares están clasificados como especies nuevas o posiblemente nuevas, con más o menos dudas. Son:

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 248. <i>Primula veris</i> | 1000. <i>Hesperis cheirantus</i> |
| 287. <i>Campanula</i> | 1005. <i>Turritis</i> |
| 434. <i>Alsine mucronata</i> | 1082. <i>Fumaria</i> |
| 581. <i>Silene gallica</i> | 1094. <i>Polygala extraaxilaris</i> |
| 589. <i>Silene viscosa</i> | 1168. <i>Vicia</i> |
| 623. <i>Oxalis</i> | 1286. <i>Lotus</i> |
| 637. <i>Euphorbia spatulata</i> | 1355. <i>Onopordum</i> |
| 642. <i>Mespilus Chamaemespilus</i> | 1356. <i>Onopordum</i> |
| 692. <i>Cistus Thimifolius</i> | 1382. <i>Gnaphalium sthechas</i> |
| 844. <i>Antirrhinum</i> | 1531. <i>Micropus</i> |
| 866. <i>Antirrhinum</i> | 1536. <i>Viola heterophila</i> |
| | 1589. <i>Croton tinctorium</i> |

Notas autógrafas

Como Muñoz Capilla utilizaba, para hacer las papeletas, fragmentos de cartas y documentos, hay muchas notas y trozos de correspondencia no botánica, de cierto interés para la historiografía cordobesa. No se incluyen en este catálogo, pero esperamos publicarlas algún día.

La escritura de Muñoz Capilla (figura 1.^a) es armónica, elevada, delicada, clara y ordenada. Los autógrafos de Cabrera (figura 2.^a) son rápidos, de grandes rasgos desproporcionados y enérgicos. Sus mayúsculas son grandes y adornadas. La escritura de Entrena (figura 3.^a) es sencilla y ensiforme. De cuando en cuando se ven notas de Lagasca. Generalmente corresponden a rectificaciones hechas en la clasificación realizada por el sabio agustino.

Portada (fig. 4.^a)

HERBARIUM / amplissimum, ac his/toricum:/ in quo no tantum/ plurimae indiginae, / sed etiam multae exo-/ ticae plantae continen-/ tur, et praecipue, quae/ prope Cordubam sponte/ crescunt:/ colectum exsicatum, atque justa/ Linnaei doctrinam dispositum á/ Raphaele de Leon et Galvez philo-botanico / cordubensi.

Clasis/prima/Monandria./Ordo/primus/Monogynia./MDCCXCIII.

Guarda.

Dn. Rafael Leon y Galvez natural de Cordoba/nacio en 26 de Junio de 1772 dedicado al estudio/de la Farmacia en la Botica de mi padre D. Roque/Muñoz Capilla se aplico con teson a la Botanica/bajo la direccion de D Bruno Fernandez: cultivo/un Jardin Botanico en la botica de D. Roque: pa-/so á Cataluña de practicante de Farmacia en el / Exercicio el año 1790, y de vuelta á Madrid, se es-/tablecio en la Corte de Mancebo, y alli se entrego/ con una aplicacion incesante al estudio de los tres/Reinos de la Naturaleza, de la Quimica, y de las/ demas Ciencias Naturales: obtuvo una Catedra en el/ Colegio de Farmacia: fue secretario del mismo y / habiendose separado de estos destinos á la entrada/ de los Franceses puso botica propia y murio en el / año 1811. Escribio una Memoria sobre el uso de/ la pita para el cordaje que merecio el premio de/ la Sociedad economica de Sevilla: y dexo M. S. varios tratados elementares de las ciencias que / enseñaba en el Colegio. Vivio sin proteccion y/ murio de 39 años quando iban madurando/ los frutos de sus tareas y de su talento./ A las plantas que dexó colectadas Leon de las quales/ se han perdido las más he añadido las cogidas por mí/ en Cordoba, Sierras de Segura y cercanias de Regla/ Fr. Jose de Jesus Muñoz [rubricado] /Cordoba Año de 1830-/

Herbarium collectum á F. Josefo á Jesu Muñoz/ tum (propiis) [tachado propriis] suis rusticationibus ac itineribus/ tum suorum amicorum auxiliis Raphaelis Leon/ Rafaelis Entrenas, Antonii Cabrera et Mariani/ Lagasca Primi apud Hispanos Botanici ab anno/ 1793 ad annum/

Clasis 1.^a/ L Canna Indica se cultiva en Cordoba/ L Salicornia Herbacea Costas de Andalucia/ Clasis 2 / L. Nictantes Sambac C.C / L. Iasminun officinale morisco/ L grandiflorum - real/SS [tachadas] Lingustrum vulgare S. S./ Phylirea latifolia S. S./ angustifolia. S. S./ media S. S./ rorismarinifolia V. S. S. L. Syringa persica C. C./ Veronica baccabimiga. S. S./ arvensis. C./ anagalis. S. S./ agrestis. C./ acinifolia C/ longifolia V. b Guadazuheros/ Spicata S. S./ Pinguicula vulgaris. Navalasna/ E Verbena Supina C/ E officinalis C/ L Caroliniana C. C./ L. Noviflora c. Sevilla/L Citriodora C. C./Viedma Salvia officinalis C.C./ etiopis. S. S./ coccinea. C. C./ L amplexicaulis./ officinalis Elchecico/ Iclarea. C. C./ L Verbenaca / L tiliafolio/ L. verticilata/ L. indeterminada/L. ceratophiloides./L. glutinosa Web./ Iustitia Coccinea. st. R. Ul./

1. *Canna indica* W/ se cultiva en Cordoba./

Monandria Monogynia./G. Salicornia /

2. *Salicornia* (Herbacea) herbacea/ patula, articulis apice compresis/ emarginato-bifidis. Pract Botan./ de Lin. pr. Palau tom. 1.º pag 22./ *Salicornia* geniculata annua./ Tourn. Cor. 51. Flora C.ª t.º 6º 234 / *Salicornia*. Dod. pempt. 82./ *Kali*. C. B. com Mat. 364./ Esta planta se cria en las/ riveras del Mar y en terrenos/ salitrosos. Me dio este esqueleto/ en Sevilla Dn. Anastasio Guzm.n/ año de 1793./

Clasis./ Diandria./ Ordo./ Monogy-/nia.

3. *Nyctanthes* (Sambac) foli-is inferioribus cordatis, obtusis:/ superioribus ovatis acutis. Pract./ Bot. de Lin.pr. Palau. t.º 2.º p.ª 37./ *Syringa Arabica*, foliis Ma-/liaurantii. C. B P. 398. Flora/ Española tomo 5.º p.ª 261./ Esta preciosa planta se culti-/ba con mucho esmero en los Jardi-/nes y muchas casas particulares/ de Cordoba, por (su) [tachado] el esquisito y / suvido olor de sus flores. La dan/ el nombre de *Diamela*. Es Ar-/busto: florece en todo el verano:/Habita en la India Lin.

4. *Jasminum* (Officinale) foliis oppositis, pinnatis:/foliolis distinctis. Pract. Bot. de Lin.pr. Pal. t.º 1.º 40 / *Jasminum* vulgare, flore albo. T. Ins. R. H. 597 Quer Flora Española t.º 5.º pag. 259./ Se cultiba en Cordoba en muchisimas ps / con la denominacion de *Jasmin morisco*. es pe./crece de 7 a 8.ps mui ramosa y debil, fe. en Mayo. [Reverso]: *Gelsiminun*. C.B.com Math in Diosc. 86.

5. *Jasminum* (grandiflorum) foliis opositis,/pinnatis: foliolis extimis confluentibus./Lin. Sp. Plant. pr. pu. t.º 1.º p.ª 41./ *Jasminum Hispanicum*, flore majore,/ externe rubente. T.Inst.R H. 597. Flora Española t.º 5.º f.º 260./ vulgo Jasmin Real / No se dice que se crie espontaneamente/ en España; pero sí se cultiva en toda ella, par-/ticularmente en Cataluña, por lo que es conoci-/do en la Europa toda con el nombre de Jas-/min Barcelonés Quer. Es Arbusto que/ crece mui ramoso á la altura de doze ó ca-/torze pies, mui debil por lo que es menester te-/nerlo enjardinado: florece desde fines de la/ Primavera hasta el Invierno./ En Cordoba se cultiva en todos los Jar-/dines: y son pocas las casas donde no hai Jas-/min: donde se hacen Ramos mui artificiosos/de sus flores. [Reverso]: *Jasminum/Jasminum Hispanicum*, gran-/deflorum. C. B. com. Mat. 87.

6. *Ligustrum vulgare*/W./ stilo bifido

7. *Philirea*/ media.

8. *Phyllyrea* / *angustifolia* W.
- 9 *Phyllirea* *latifolia*/ W./ Siles
10. *Phillyrea* *rorismarini*/ folio W. Es variedad/ de la *angustifolia*.
11. *Syringa* (*Persica*) Vs. a *laciniata*. P./ Bot de Lin.pr Palau t.º 1º p.ª 50./ *Syringa* *foliis lanceolatis, integris, dissectisque*. Lin. Hort. Clifffort. 6./ *Lilac laciniato folio*. Tourn Inst./ R Her 602. Flora Española t.º 5.º 343./ Don Josef Quer en su Flora Espa-ñola dice haberla visto en los cerros del/ termino del lugar de Miraflores de la / Sierra; y tambien en los de Bustarvi-/ejo. Se cultiba en Cordoba en el Jar-/din del Obispo, y en los del Marques/ de Villaseca, y en otros de curiosos / Es un Arbustico endeble que crece/ de quatro á cinco pies, florece en Mayo/ y Junio./ En sentir de algunos Botanicos esta/ que Linneo pone por variedad de la Sy-/ringa; *Persica*; se debe tener pr. especie distinta.
12. *Veronica* *spicata* [tachado *spicata*] W./longifolia W/varie-tas β.
13. *Veronica* *spicata* W/Siles.
14. *Veronica* *Baccabunga*/ W.
15. *Veronica* *anagalis* /W.
16. *Veronica* *agrestis*/Cordoba W.
- 17 *Muy rara y escasea*/ *Veronica* *Arvensis* W. ¿an *agrestis* W?
18. *Veronica* *arvensis*/W./Cordoba.
19. *Veronica* (*arvensis*) *floribus solitariis, foliis corda-/tis incisis pedunculo longioribus*. Pract. Bot. de Lin./por Palau tº. 1º. pag. 73./ *Veronica* *flosculis cauliculis adherentibus*. T. Inst./R. H 145. Flora Española t'. 6º. pag. 455./ Esta especie nace con frequencia en los Jar-/dines y tierras cultivadas de Cordoba: crece dere-/cha, florece en el principio de la primavera, es annua.
20. *Veronica* *acinifolia*/W.
21. *Pinguicula* vulgar/ Navalasna en el/arroyo qe. baja á/espaldas de la Casa/en Junio de 1829.
22. *Verbena* (*Nodiflora*) *tetrandra, /spicis capitato-conicis, Foliis ser-/ratis, caule repente* Pract. Bot. de Lin. pr. Palau tº. 1º. pag. 110./*Verbena* *nodiflora*. C. Bauh./comment Mat. sup. Diosc. 742./Coji esta planta en el Jardin/Botanico de Sevilla año de 1793./ Se cria en Virginia y Sicilia: y en/España en Barcelona y Valencia/ cerca del Mar.Palau./Su raiz es perenne.
23. *Verbena* *Caroliniana* L/Entrena.
24. *Verbena* (*Caroliniana*) *tetrandra, /spicis filiformibus, foliis*

indivisis lan-/ceolatis serratis obtusiusculis subses-/silibus. P. B. de L. pr. Palau tº. 1.º 111.../Habita en la America Septentrio-/nal. Pal /Su raiz es perenne /Me dio este esqueleto Don/Anastasio Guzman, en Sevilla/ en Septiembre del año de 1793./ con aquel nombre generico y especifico.

25. Vervena officinalis (Lin).

26. Verbena Supina.

27. Verbena citridora/Entrena.

28. Class. Secunda Diandria Ordo/Monoginia / *Salvia officinalis*: Linn Tomo/2º. pr. Palau pag.^a 128/ *Salvia* oficial/Esta util y salutifera planta/se cultiva en Cordova pr. algunos/curiosos, bajo el nombre de *Salvia*/fina; desde que se principia a/cultivar, pierde mucha parte de/la finura y grato aroma que po-/see en las sierras de Granada/de donde probablen.te la traerian/a esta Ciudad, pues que en esta/Sierra no se cria: es poderoso remedio contra todas las/enfermedades de Nervios, toni-/ca, Estomatica, y un poco astrin/gen-te; ultimamte. los antiguos/ ponderaron tanto sus virtu/des, que pr. ella preguntaron a el oraculo: «Cur moriatur/ «homo, dun *Salvia* nascatur in/ «Horto» a que respondio «con-/tra vim mortis, non est me-/dicamentum in Hortis» como/ indicando, qe. ano ser pr. esta/razon, seria un remedio uni-/versal.

29. *Salvia officinalis*? /12. C. [tachado]/ esta es la mas fina qe/ llaman Granadina/ V. 5 de Julio.

30. *Salvia Verbenaca*

31. *Salvia* (Verticillata) foliis corda-/tis crenato-dentatis, verticillis sub-/nudis, stilo corollae labio inferiori-/ incumbente. P. B. de L. pr P. tº. 139 /*Horminum* sylvestre latifo-/lium verticillatum. T. Inst. R. Her./178. Flora Espa. tº. 5º. pa. 237./ Esta especie se cria en Castilla/la vieja acia la Ciudad de Avila:/ en la Alcarria, y Serrania de Cu-/enca. Quer Florece en el Estio. / Coji este esqueleto en el Jardin/ Botanico de Sevilla año de 1793.

32. *S. glutinosa* L./ *Salviae* species.

33. Clas Iª. Diandria Ord. Monoginia/ *Salvia sclarea*/Linn. Tom 1º. pag.^a. 143/ *Salvia* Esclarea (vulgo) Amaro. [Reverso]: *Salvia Sclarea*.

34. *Salvia etiope*

35 *Salvia* (ceratophylloides) foliis pin-/ natifidis rugosis villosis, caule pani-/culato ramosissimo. Pract. Bot. de/Lin. pr. Palau tº. 1º. pag. 144/Habita en Sicilia y Egipto Palu./ Esta especie la he

visto cul-/tizada en el Jardin Botanico de/ Sevilla; en donde coji este esque./leto en Septiembre de 1793.

36 *Salvia* (coccinea) foliis cordatis/ ovatis acutis serratis, sub-
tus mol-/lissime tomentosis; racemo termi-/nali verticillato. P. B. de
L. pr. P. tº. 1º. 148./Habita en el Cabo de Buena-espe-/ranza Lin.
pr. Pal./He visto esta especie cul-/tizada en el Jardin Botanico de/
Sevilla; de donde traje á Cordoba/ semilla de ella, y este esqueleto/
en el mes de Septiembre del año/ de mil setecientos noventa y tres.

37. *Salvia amplexicaulis* Lamarr/ C m R H M

38. *Salvia tilifolia*. [Reverso]: an *Serotina*?

39. *Salviae* especies.

40. *Fraxinus ornus*

Triandria Monogynia.

41. *Valeriana* (Rubra) floribus mo-/nandris caudatis, foliis lan-
ceolatis in-/ tegerrimis. Pract. Bot de P. tº. 1º. 181./ *Valeriana rubra*.
T.I.R.H./ 131. F. C tº. 6º. 443. Dod. pempt. 91./ *Valeriana rubra dicta*.
C. B./ com. Mat. in Diosc.pª. 40./ Se cria en España en Aragon/
cerca de Villarlengo, Montalvan,/ Camarena etc. Quer./ En Cordo-
ba se cultiva en los/ Jardines, y por los curiosos./ Crece dos á tres
pies de alto:/ produce muchas ramas, es perenne/ y florece en los
Meses de Abril/ y Mayo.

42. *Valeriana calcitrapa*? / Mayo vespere lugubri/ Viznagar?/
An dioica? [Otra etiqueta]: *Valeriana* / V. 5 de Julio

43. *Valeriana* (Cornucopiae) floribus diandris ringentibus/ foliis
ovatis sessilibus. P. B. de Lin. pr. Pal. tº. 1º. pag. 182./ *Valerianella*
cornucopioides, flore galeato./ T. Inst R. H. 133. Flora Española
tº. 6º. pag. 446./ *Valeriana peregrina purpurea*. C. B. comm./ Matt.
sup. Diosc. pag. 40./ Esta especie se cria en todos los campos de
la-/ bor del circuito de Cordoba: es annua fe. en Abril.

44. *Valeriana dioica* W./ 1834/ Cordoba.

45. *Valeriana* (Phú) floribus triandris,/ foliis caulinis pinnatis,
radicalibus in-/ divisis. P. B. de Lin. pr. P. tº. 1º. pª. 184./ *Valeriana*
hortensis, Phu fo-/ lio Olusatri, Dioscoridis. T. Inst. R./ H. 132. Quer
F. E. tº. 6º. pª. 442./ Phu magnum. C. B. com. Mat./ sup. Diosc. 38.
Lag. 19 / *Valeriana hortensis*. Dod p. 349./ Farm: *Valeriana mayor* /
Se cultiva en Cordoba esta Va-/ leriana, en la Alameda, y yo/ la he
cultivado, y remitido al Jar-/ din Botanico de Sevilla planta/ viva.

Es perenne y florece en/ Mayo y Junio. Se usa su raíz en/ la Medicina.

46. Valeriana/ tuberosa W.

47. Valeriana locusta / v. coronata. 19. C.

48. Valerianae species / Valeriana locusta.

49. Valeriana /pumila/ fructu/ 6-dentato/ caule simplici/ foliis immis linearibus in-/tegris summis trifidis.

50. Loefflingia hispanica /Lin/ Soto de Migs calientes. [Otra etiqueta]: 35 Loenflingia. H / Cordoba.

51. Iris pseudo acorus W./ imberbis foliis ensiformibus/ petalis alternis stigmatibus/ minoribus. Germen trigo-/ num angulis sulcobilidis.

52. Yris Virginica.

53. Class. Tertia Triandria. Ord./ Monoginia / Yris Martinicensis? / Linn. pr. Palau tomo 1º. p.^a/ 241 Lirio de la Martinica. es planta cultivada / en casi todos los jardi-/ nes de Cordova y entre/ ellos en el de casa donde cogi este esque-/ leto

54. Triandria Trigynia./ Yris Persica

55. Schenus fuscus / W.

56. Cyperus Fravescens W.

57. Cyperus Fuscus W.

58. Ciperus flannonicus /W.

59. Scirpus Lacustris/ Cabrera.

60. Scirpus holoschaenus (Cav).

61. Scirpus autumnalis/ W.

62. Scirpus Sylvaticus. W.

63. *Cenchrus capitatus*/ Esta planta se la en-/vie al S.or Ortega, por *Anthoxanthum*? :y á/ la verdad, ni yo le he vis-/to fs. ms., ni tres estam-/bres ni 1 pistilo; sino todas hermaf-/ dos estambres. y dos pist.os

64. *Sacharum Cilindricum*./ (Cav) / Hermosa Grama/La he cogido frente de Casillas/ Por el lado opuesto a la Alameda.

65. *Phalaris nudusa*?/ nodosa W.

66. *Panicum Viride* Lin.

67. *Panicum Sanguinale* Lin

68. *Panicum Crus-corvi* (Cavs)

69. *Panicum Dactilon* (Lin)/ ó *Paspalum Dactilon* (Cavans).

70. *Panicum Asperrimum* Lag^a. C in R H M.

71. *Panicum Coloratum* (Lin.) / *P. Repens* et *P. coloratum* (Cavans) / Cavans ha reunido estas dos especies/ en una

72. *Panicum Repens* Cava / *P. Coloratum* L.
73. ¿*Phleum Bellardi* W.?/ *P. Nodosum* W.?
74. *Alopecurus pratensis*/W. [Otra etiqueta]: *Alopecurus Pratensis*. L./ En esta especie faltan las aristas á la / corola. Son de notar las glumas del/ caliz comprimidas *graciosam.te*
75. *Alopecurus Agrestis* L.
76. *Alopecuro*/ arrodillado.
77. *Alopecurus Monspeliensis*/ *Agrostis Panicea*. W./ Willdenow ha hecho un agostis de/ este *Alopecurus* reuniendo las dos/ esp.s *Panicum* y *Monspeliensis*.
78. *Alopecurus Paniceum* (Cavans).
79. *Millium effusum* [tachado]/ 16. L./ *Sorghum halepense*/ *Millium halepense* Cav.
80. *Millium Multiflorum* (Cavans).
81. *Rara*/ *Agrostis interrupta* W.
82. *Agrostis canina* L.
83. *Agrostis Capillaris* L.
84. *Agrostis capillaris* Lin.
85. *Agrostis minima* W.
86. *Agrostis Minima* W.
87. *Agrostis vinealis*: vars. β . W./ *A Gigantea* Roth.
88. 25 *Aira* H.
89. *Aira Aquatica* L.
90. *Aira Cespitosa* L.
91. *Melica Nutans* L./ C in R H M.
92. *Melica altissima*.
93. *Melica Montana* Cav.
94. *Melica Montana* Cav.
95. *Poa*.
96. *Poa*.. n.º 12 L/ n.º 11 H./ *Poa annua*.
97. *Poa* n.º 11/ *megastachya* L. Peas./n.º 10. H/*Briza eragrostis*. [Otra etiqueta]: *Briza eragrostis*. L./ó *Poa Eragrostis* L./ Entrena/ Estas dos plantas se confun/ den y acaso son una misma/ Cavan.s p.^a 312.
98. n.º 14. L./n.º 13 H/ *Poa rigida*.
99. *Poa Rigida* Cav.s
100. *Poa Bulbosa* L.
101. *Poa pratensis* [tachado] n.º 9 L./ *Briza minor* n.º 5 H/ esta es

102. *B. virens*/Entrena/8/Briza L. n.º 8 media/ *virens*.- -H n.º 8.
103. Briza media./ Poa [tachado] n.º 7 L. *varietas* / maxima/ n.º 7 H. media.
104. Briza ó Poa /maxima.
105. Briza maxima/ Poa n.º 6 L./6 H.
106. *Cynosurus Echinatus*. L. [Otra etiqueta]: n.º 15. L/n.º 14 H./ *Cynosurus echinatus*
107. *Andropogon* [tachado] L n.º 5/H n.º 4/*Cynosurus aureus*.
108. *Festuca*/ *Dumetorum*/W.
109. *Festuca foenicoides* /n.º 3 L/n.º 2 H.
110. *H Bromus matritensis*. / y Lag.
111. *Festuca foenicoides*/n.º 3 L/n.º 2 H/ *Bromus*/mollis.
112. *Bromus Mollis* L.
113. *Bromus Pinnatus* L [Otra etiqueta]: *Bromus Pinnatus*, L.
114. *Stipa plumosa*/v. *pennata*/ n.º 1 H. [Otra etiqueta]: *Stipa Pennata* L./Entrena.
115. ¿*Stipa capillata* L? [Otra etiqueta]: *Stipa Juncea*/Cabrera.
116. *Avena Elatior*. L. [Otra etiqueta]: *Avena Elatior*.

Triandria Digynia

117. *Avena* [Otra etiqueta]: *Avena fatua*.
118. n.º 13 L *avena panicea*/n.º 12 H./ *Bromus* [tachado]. [Otra etiqueta]: *Avena Panicea* Lamarc.
119. *Arundo Species*?
120. ¿*Aristida Hystrix* L? /No es la *A Elatior*. [Otra etiqueta]: *Aristida* /*Elatior* /Cavanilles/Cabrera.
121. *Lolium* (temulentum) spica aristata, spiculis com-/pressis multifloris. Pract. Bot. de Lin. pr. P. t.º 1.º p.ª 482. /Gramen *Lolia-ceum*, spica longiore, aristas/ habens. T. I. R. H. 516. Flora Española t.º 5.º pag. 176./*Lolium*. Lag. 187. C. B. com. Mat. sup. Diosc. 331./ Esta planta se cria entre los sembrados de las/ Campiñas de Cordoba y en los del ruedo de la Ciu-/dad, la llaman vulgarmente *Ballico*; es annua/ Florece en Abril.
122. *Rottboellia cylindrica*. W./Entrena. [Otra etiqueta]: *Rotbo-llia Cilindrica*/Schreber/ Cabrera.
123. *Aegilops ovata*/Linn./R.1 Casa de Campo/Madrid.
124. *Aegilops*/Ovata -t. L G L.
125. La creo un *Andropogon*/ *Andropogon hirtus*. (Wild).

126. *Alopecurus agrostis* [tachado] / *Andropogon hyrtum* 17 L.
[Otra etiqueta]: Puede ser mas bien/ *Andropogon ischoemum*/L. /Yo
asi lo tengo deter/minado Entrena.

127. *Holcus Spicatus* L.

128. Remito á Vmd el exemplar / que me encargó del *Holcus*
Saccharatus L./ en mejor estado qe el otro.

129. *Secale cereale* Cav.s

130. *Triandria Digynia Hordeum Vulgare*/Cabrera.

131. *Hordeum*/Nodosum/Cabrera.

132. *Triandria. Digynia /Hordeum. Hordeum* (Murinum) flos-
culis lateralibus mas-/culis aristatis, involucris intermediis ciliatis./
Pract. Bot. de Lin pr. Palau tº 1.º pag. 521./ *Gramen secalinum*, spi-
catum, vulgare. /T. I. R. H. 517. Flora Española t.º 5.º pag. 189./Esta
especie se cria con abundancia en/Cordoba en los alrededores y
algunas calles/poco pisadas de la ciudad. es annua fe. en Abril.

133. *Triticum* (aestivum) calycibus quadrifloris ventri-/cosis
glabris imbricatis aristatis. Pract. Botan. de/Lin. pr. Palau tom. 1.º
pag. 523./*Triticum* aristis longioribus. spica alba. Tour./Inst. R. H.
512. Quer Flora Esp. t.º 6.º pag. 427./Bien savida es la fertilidad de
las Campiñas de/ Cordoba, particularmente en criar los trigos que,
anu-/almente se siembran en sus dilatadas tierras.

134. *Triticum Maritimum* L/ No creo qe. sea trigo.

135. *Triticum Ciliatum*. Cav.

136. 2.º 24 H./Emparedada/1 de Sbre. de 815

137. *Globularia vulgaris*. [Otra etiqueta]: *Globularia vulgaris*
W./ caule folioso foliis ovatis/ integerrimis. Siles/20 de Marzo.

138. *Globularia/spinosa*/W.

139. *Scabiosa leucantha* L./*Lepicephalus leucanthus* Lag /Viz-
nagar 24 Julio.

140. *Scabiosa* (succisa) corollulis quadri-/floris aequalibus, cau-
le simplici, /ramis approximatis, foliis lance-/olato-ovatis. P. B de
L. pr. t.º 1.º 603 / *Scabiosa folio integro gla-/bro*. T. I. R. H. 466.
Flora Espa-/ñola t.º 6.º pag. 260./ Esta especie vi cultivada/en el
Jardin Botanico de Sevi-/lla donde cogi este esqueleto, en/ Septiem-
bre de 1793. Se cria en/ muchas partes de España: su/ raiz perenne,
florece en el Estio.

141. *Scabiosa arvensis*/W.

142. *Scabiosa arvensis*/Sierra de Segura/Siles.

143. *Scabiosa Stellata*/Cabrera.

144. *Scabiosa Stelata*/varietas minor α .
145. *Scabiosa stellata* L./ *Asterocephalus* Lag./Viznagar. [Otra etiqueta]: *Scabiosa*/ Viznagar 26 Julio.
146. Clas. 4 *Tretrandria* ord. *Monoginia*/*Scabiosa* (Atro-purpurea) / Linneo Tomo 1.º Pag. 611 / (Vulgo) / viuditas.
147. *Scabiosa ochroleuca*/ de Chipiona á/Regla [Otra etiqueta]: *Scabiosa ochroleuca*/ Cabrera.
148. *Scabiosa rutaefolia*?
149. *Scabiosa Rutofolia*/ Cabrera.
150. *Scabiosa tomentosa*. Cav. Ic./ *Asterocephalus tomentosus*/ Lag./ Sierras de Segura.
151. *Scabiosa*.
152. *Scabiosa*...?/ La especie no se puede/ determinar sin ojas./ Entrena.
153. *Sherardia Arvensis*. L.
154. *Asperula Arvensis*/ Cav/
155. *Asperula arvensis*.
156. *Asperula*/ *odorata*/W. [Otra etiqueta] Especie de la anterior/ *jazminum redolet*./ *Asperula* Si/Vzgr. 20 Julio.
157. *Asperula* (*arvensis*) *foliis senis, floribus terminalibus*) *sessilibus aggregatis*. P. Bot. de Lin. pr. Palau. t.º 1.º pag 634./ *Gallium arvense*, *floré caeruleo*. T. Inst R. Herb./115. Quer Flora Española t.º 5º pag. 149./ *Asperula caerulea*. Dod. pempt. 355./ Esta planta se cria entre los sembrados de los alrre-/dedores de Cordoba, con especialidad en los que estan/ situados hacia la falda de la Sierra./ Es annua y flo-/ rece en los meses de Abril y Mayo.
158. *Asperula cynanchyca* L. [Otra etiqueta]: Corola monopetala tubo infundibili/ forme lacinias 4 =estambres 4 ó /anteras oblongas pegadas al borde /interior del tubo= estilos dos fili-/forme mui [tachado] cortos qe. apenas suben/ la [tachado] 1/3 del tubo= estigmas en cabezuela/ germen bilocular.
159. *Asperula*/hexaphila/W.
160. *Gallium Montanum* L.
161. *Tetrandria Diginia*/ *Gallium*. [Otra etiqueta]: *Galium Verum* L./ ó/G *purpureum* L./ Entrena.
162. *Gallium Aparine*/ Entrena.
163. *Gallium caesaraugustanum* L.
164. *Gallium Erectum*/ Cavn. lles/ Cabrera
165. *Gallium Latifolium*. L./*Gallium foliis senis obovatolanceo-*

latis/ retrorsum serrato-aculeatis panicula difusa, /flore Luteo./ Las corolas son quinquefidas con cinco estam/bres y todas abortan; lo he hallado en la Campiñue/la y en la Palomera. observando en ambas los/ mismos caracteres




Figura 1.ª - Autógrafo del P. Muñoz Capilla, en su herbario.

166. Class. IV Tetrandria Ord. Monoginia/ Crucianela Angustifolia L.? /Linn. Tom. 1.º pag.ª. 662/ Crucianela de oja angosta. [Otra etiquetá]: Esta especie esta equivocada/pues no tiene flores/ espigadas, dudo que/ sea crucianella.

167. Crucianella Angustifolia L.

168. Crucianela/angustifolia. [Otra etiqueta]: Crucianella/Angustifolia L/Cabrera/ de los puertos apdnos. [Otra etiqueta]: Crucianela/ de Cordoba/ seran variedades.

169. *Crucianela*/marítima.
170. *Plantago* (major) foliis ovatis glabris,/scapo tereti, spica flosculis imbricatis./Lin. Spec. Plant. pr. pu. t°. 1°. p^a. 691./ *Plantago latifolia*, sinuata. Tourn./Inst. Rei Herv. 126. Flora Española t°. 6°. 107./*Plantago* major. Lag. in Diosc. 209./Dod. pempt. 107 / vulgo: Lanten./ Esta Planta es muy comun en Cordoba:/abunda mucho en las huertas, en los Arro-/yos de las peñas, y Pedroches, y en sotos/humedos. Es perenne, y florece por Ma-/yo y Junio. [Reverso]: *Plantago* (major) foliis ovatis glabris,/ scapo tereti, spica floribus.
171. *Plantago* Media.
172. *Plantago lanceolata*/v β /trinervia/W.
173. *Plantago* (Lanceolata) foliis lanceolatis/spica subovata, nuda, scapo angulato./ Palau: t. 1.º p. 654.
174. *Plantago* (Albicans) foliis lanceolatis obliquis villosis, spica cylindrica erecta, scapo tereti. P. B. de L. p P. t°. 1°. pag. 695./ *Plantago angustifolia*, albida, Hispanica. T I R. H /127. Quer Flora Española tom. 6°. pag. 109./*Holostium hirsutum albicans* majus. Casp. Bauh./ commet Matth. sup. Diosc. 687./ Se cria esta especie en los alrededores de Cordoba/ en sitios aridos como margenes de caminos, paredones, y te-/rrenos de esta naturaleza: es su raiz pe, fe. Abril y Mayo.
175. *Plantago*/ albicans/W.
176. *Plantago alpina*/W.
177. *Plantago coronopifolia*./ Entrena.
178. *Plantago* (Coronopifolia) foliis linearibus dentatis,/ scapo tereti. Pract. Bot. de Lin.pr. Palau t°. 1°. pag 699./ *Coronopus sylvestris hirsutior*. T. Inst. R. H. 128./ Quer Flora Española. t° 5°. pag 6./ *Herba stella*, seu cornu cervinum. Dod. pempt. 109./ *Coronopus*. Lag. in Diosc. 212. Casp. Bauhin./ comment. Matth. pag. 383 =vulgo: Estrellamar / Se cria en los caminos, y tierras arenosas de/ Cordoba: es perenne y florece en Abril y Mayo. [Otra etiqueta]: *Plantago coronopifolia*.
179. *Plantago Subulata* L./ Venta del Esptu Sto.
180. *Plantago* (Serraria) Foliis lanceolatis quinquener-/viis dentatoserratis, scapo tereti. Pract. Bot. de Lin./ por Palau. t°. 1°. pag. 699./ Esta especie se cria en abundancia en algunos/ sitios humedos de los campos de Cordoba, como en tie-/rra de los Palacios de la Galiana á los lados del camino/ que atraviesa desde el arroyo del Moro á la Puente/Sansueña. =Es perenne florece en Mayo.

181. *Plantago* (*Psyllium*) caule ramoso herbaceo/ foliis subdentatis recurvatis, capitulis/ aphyllis. Pract. B. de Lin. pr. P. tº. 1º. 700./ *Psyllium majus erectum* T. Inst. /R. H. 128. Flora Española. tº. 6º. 143./*Psyllium*. Dod. pempt. 115/ Lag. 418 = C. B. in Matth. 753./ vulgo: Zargatona./ Esta planta es mui comun en/los caminos y margenes de las tierras/ de labor de los campos de Cordoba,/ particularmente hacia la Albayda/ es annua y florece en Abril y Mº. [Otra etiqueta]: *Plantago psilium* Lin.

182. *Plantago Loefflingii*. W.

183. *Plantago Bellardi*. W. Ambos son del Arrollo de las Piedras.

184. *Plantago coronopus*.

185. *Eleagnus Angustifolia*/vulgo - Cinamomo.

186. *Alchemilla Vulgaris* W.

187. *Polygamia*, *Monoecia*/*Parietaria* (cretica) foliis subovatis, involucris fructiferis quinque-/fidis compressis: laciniis laterali-/bus majoribus. Pract. Bot. de/Lin. pr. Palau tº. 1º. pag. 762./Habita en Creta. Lin./Coji esta planta en el Jar-/din Botanico de Sevilla, año de/1793. donde me la dieron aquel/nombre generico, y especifico.

188. *Aphane/arvense*. [Otra etiqueta]: *Aphane*.

189. *Cuscuta* (*Europaea*) floribus sessilibus./Pract. Bot. de Lin. pr. Palau tº. 1º. pa. 777./ *Cuscuta major* T. Inst. R. Her./ 652. Flora Española tom. 5º. pag. 25/*Cuscuta*. C. B. comm. Matt. sup./ Diosc. 879. Laguna 491./Farm. *Cuscuta* ó *Epithymo*./ Esta parasitica planta se halla/ en Cordoba, en las inmediaciones de el/ arroyo Pedroches sobre las plantas que/ se crían entre los peñascos, y en otras/ partes: es annua y florece por Mayo./ Quando se halla sobre el tomillo se la da/ el nombre de *Epithymo*, y como cre-/ce sobre qualquier especie, recibe va-/riado este nombre, compuesto de la voz/ Griega *ἐπι*, qe. corresponde á la Latina/ *sub* que en nuestro Ydionma equibale/ á *en*, y del nombre de la planta qe./la sustenta, como *Epitimbra*, *Epise-/so*, *Epiteucurio*, *Epicisto*, *Epithapsia* &c./ por estar la del esqueleto asida á un-/ a Pimpinela se podria llamar *Epipote-/rio*; haunque mas bien se acomoda el/ *epi* con nombres de dos syllabas.

190. *Hypecoum* (*Procumbens*) siliquis arcuatis compressis articulatis. Pract. Bot. de Lin. pr. Palau tº. 1º. pag. 779./ *Hypecoon latiore folio*. T. Inst. R. H. 230. Flora Española tº. 5º. pag. 242.= *Hypecoum*. Dod. pempt. 449./ *Cuminum* sylvestre II C. B. com. Mat. 556./ Esta planta se cria con abundancia en los campos de labor/

del circuito de Córdoba, particularmente en los del camino/ de Lope-garcia; es annua, florece en Marzo y Abril.

191. *Hipocoum procumbens*. Elcheico Abril/1812.

192. *Hipocoum pendulum*.

193. Acebo/*Ylex aquifolius*/Royo frio 17 Agto.

194. *Ilex Aquifolium* L.

195. *Potamogeton* (natans) foliis oblongo-ova/tis petiolatis nantibus. Pract. de Bot./ de Lin. pr. Palau tº. 1º. pag. 784./*Potamogeton rotundifolium*. Tourn./ Inst. R. Herv. 233. F. Esp. tº. 6º. pª. 133 / an *Potamogeton Dioscoridis*?/ Esta planta se halla en Cordoba./ en el Arroyo Pedroches, en el de Ra-/banales, y en las balsas del Guadal-/quivir, en el Arrollo de la Palomera/ y en otros sitios de Agua./ Crece sumergida en las aguas/ echando una raíz gruesa asida al fon-/do, y elevando sus tallos hasta la super-/ficie, (por muy hondo que este) donde na-/dan sus ojas sostenidas de largos pezo-/nes. Sus espigas salen fuera del agua/ á florecer, en los Meses de Junio y Julio.

196. *Potamogeton Lucens*. Lin.

197. *Potamogeton crispum* (Lin). [Otra etiqueta]: *Potamogeton* (crispum) foliis lanceola-/tis alternis oppositisve undulatis serra-/tis. Pract. Bot. de L. pr. Palau tº. 1º. 786./*Potamogeton foliis crispis*, sive Lac-/tuca ranarum. Tourn. Inst. Rei Herv./ 233. Flora Española tom. 6º. pag. 133./ Esta planta havita sumergida/ en las aguas de varias partes de/ España: en la Alcarria, en la se-/rrania de Cuenca. &c. Quer, y en/ Andalucia./ Traje este esqueleto de Sevilla/ año de 1793. me lo dio Guzman.

198. *Sagina procumbens* L. y W./ *Sagina procumbens*/ La dificultad consistia en que nosotros suponiamos que solo poseia 3 estilos, pero observando muchas flores me cerciore de que tenia 4 y caxa de/ 4 ventallas, pª. observar bien esto conviene ver los/ frutos algo pasados y mucha paciencia.

Clase IV.

199. Pentandria Monogynia. *Heliotropium* (indicum) foliis cordatooba-/tis acutis scabriusculis, spicis solitariis, fruc-/tibus bifidis. Lin. Sp. P. pr. pu. tº. 2º. pª. 40./ Habita en una y otra India. Lin./ es annual y florece por Julio y Agosto. Crece/ á la altura de dos pies: yo la he cultivado en/ Cordoba á donde vino la semilla de Sevilla/ remitida por Dn. Pedro Abat, despues mi corres-/pondiente.

200. *Heliotropum indicum*/ Lin/ C in R. H. M.

201. *Heliotropum* (Europaeum) foliis ovatis/ integerrimis tomentosis rugosis, spicis con/ yugatis. Lin. Sp. Plant. pr. pu. tº. 2º. pª. 41./ *Heliotropium majus*, Dioscoridis. Tourn./ Inst. R. Herv. 139. F. E. tº. 5º. 211./ *Heliotropium*. Dod pempt. 70./ *Heliotropium majus*. Lag. in Diosc. 499./ vulgo: Verrucaria / Esta planta se cria con mucha abundan-/cia en Cordoba: en el campo de la Merced, en/ el Marrubial, y demas inmediaciones de/ la ciudad. Es annua, y florece en el Ve-/rano. La usan fresca machacada, y aplicada/ sobre las verrugas para consumirlas.

202. *Heliotropium Europeum*.

203. *Heliotropium Parviflorum*/ Lin./ Cojido en Buenos aires.

204. *Heliotropium* (supinum) foliis ovatis/ integerrimis tomentosis plicatis, spicis so-/litariis. Pract. Bot. de L. pr. P. tº. 2º. 42./ *Heliotropium minus*, supinum. T./ I. R. Herv. 139. Flora Esp. tº. 5º. 211./ Dodor. pempt. 70 / Esta planta se cria cerca de/ Cordoba en sitios humedos y arenosos/ en frente de los Pelambres del lado/ de halla del Rio. La he visto con mu-/chisima abundancia desde Cordoba á/ Almodovar. Crece echada sobre la tie-/rra, es annua y florece en Julio y/ Agosto.

205. *Heliotropium Supinum*/ Lin.

206. *Heliotropium* (Curasavicum) foli-/is lanceolato-linearibus glabris/ aveniis, spicis conjugatis. Pract. Bot./ de Lin. pr. Palau tº. 2º. pag. 42./ Habita en lugares maritimos de/ la America mas caliente. Pal./ Esta planta americana la/ hé cultibado en Cordoba, es annua,/ florece en el estio: toda la planta/ quando viba es de color garzo; bol-/viendose denegrida en la desecaci-/on, lo que sucede ordinariamente. á las/ mas especies de este genero.

207. *Miosotis scorpioides*.

208. *Myosotis versicolor*.

209. *Lithospermum*/ officinale/ Orilla del rio Carrizal/ al pie de un cerrillo/ en cuya cumbre hai ves-/tigios de una atalaya/ lo cogi en la primavera de/ 1812. Muñoz.

210. *Lithospermum* (Arvense) seminibus/ rugosis, corollis vix calycem superan-/tibus. Pract. B. de Lin. pr. P. tº. 2º. 49./ *Buglossum arvense*, annuum,/ *Litospermi folio*. T. I. R. H. 134. / Flora Española tom. 3º. pag. 312. / *Lithospermum arvense*, radice / rubra. C. B. com. Mat. sup. Diosc. 658. / Nace esta planta en los alrre-/dedores de

Cordoba entre los sembra-/ dos del Marrubial, los Palacios de la / Galiána, y otros sitios. / Es annua, y florece por los / meses de Mar- zo y Abril.

211. *Lithospermum Arvense*. Cav.
212. *Lythospermum/ fruticosum*/W.
213. *Lithospermum / Dispermum*/W.
214. *Lythospermum/ tenuiflorum*/W.
215. *Lithospermum/ apulum?*/ W.
216. *Anchusa officinalis*. L.
217. *Anchusa* (Officinalis) foliis lanceolatis, spicis im-/bricatis secundis. Pract. Bot. de Lin. pr. Palau tº. 2º. 55./ *Buglossum angustifolium majus*, flore al-/bo vel coeruleo. T Inst. R. H. 134. Flora Espª. tº. 3º. 310./ *Buglossum vulgare*. Lag. 456. C. B. comment./ Matth. sup. Diosc. 825.=vulgo: *Lenguazos*. / Esta planta se cria en los campos de labor del / circuito de Cordoba: su raiz es perenne, fe. en Abril.
218. *Anchusa/ angustifolia*/ W.
219. *Anchusa/ undulata*
220. *Anchusa/ tinctoria*.
221. *Cinoglossum /choeirifolium*/ W.
222. *Cynoglossum cheiranti-/ folium*. L./ Cabrera.
223. *Cynoglosa lusitanica*.
224. 12. *Cinogl. linif.* H.
225. *Cynoglossum* (Linifolium) foliis line-/ ari-lanceolatis glabris. Pract. Bot. de/ Lin por Palau tº. 2º. pag. 63./ *Omphalodes Lusitanica*, Linifo-/ lio. T. I. R. H. 140. Flora Esp. tº. 6º. 13./ Esta planta se halla en varios / sitios de los campos de Cordoba, como/en tierra de las canteras y camino/ de la Palomera; pero donde abunda / mas y crece con mayor lozania es/ en todos los llanos qe median entre/ la Alameda y el Molino de Casillas./ Es annua y florece en Abril y Mº. Los colme/ neros la conocen con el nombre de *Nevadilla*
226. 14. C./ *Cinoglossum?*/ *Helianthemum/ guttatum*.
227. *Cynoglosa alisada*.
228. *Cynoglossum myosotoides?*/ W.
229. *Cynoglossum/ cristatum*/ W./ varietas?
230. *Pulmonaria* (angustifolia) foliis ra-/ dicalibus lanceolatis. Pract. Bot./ de Lin. pr. Palau tº. 2º. pag. 65./ *Pulmonaria alpina angusto/ folio*, Italica. T. Inst. R. H. 136./ no la trae Quer en su Flª.

Esp^a./ Esta planta se cria en los al-/rrededores de Cordoba, en los
pare/ dones de las hazas, como en las/ de mas aya de la Huerta
nueva/ camino de la piedra de la buena/ vista, y junto á la Huerta
bayá/dares cam^o. de la Al^a. fle. en Abl. 21.

231. Pulmonaria subfruticosa.

232. Simfitum officinale Lin.

233. *Symphytum* (Officinale) foliis ovato-lanceolatis/ decurren-
tibus. Pract. Bot. de L. pr. Palau t^o. 2^o. p^a. 69./ *Symphytum* conso-
lida major. T. Inst. R. H./ 138. Quer Flora Española t^o. 6^o. pag. 344./
Symphytum alterum. Lag. 382./ Esta planta se cria en varias partes
de España/ y se cultiba en Cordoba: es pe. y fe. en Abl. y M^o

234. Class quinta Pentandria Ordo/Monoginia./ *Simphitum* tu-
berosum/ Linn. pr. Palau tom. 2^o. p^a./ 69 *Simphito* tuberoso/ Se
cultiba en Cordova pr./ algunos curiosos y entre otros en/ el Hospi-
tal de Jesus de donde/ cogi este esqueleto; es peren/ ne y florece pr.
Mzo. y Abl.

235. *Symphitum* (tuberosum) foliis se-/midecurrentibus; summis
oppositis./ Pract. Bot. de Lin. pr. P. tom. 2^o. 69./ *Symphytum* majus,
tuberosa/ radice. T. Inst. R. H. 138. Flora / Española tom. 6^o. pag.
345./ *Symphytum* tuberosum. Dod./ pempt. 134./ *Symphytum* majus
tuberosa/ radice. C. B. com. Mat. sup. D. 683./ Se cria en las monta-
ñas de/ Santandér, y otras muchas partes/ de España. Se cultiba en
Cor-/doba en la Alameda, en el Hos-pital de Jesus Nazareno y en
el/ del cardenal, y tambien yo la/ he cultibado. Su raiz es perenne/,
y florece por Abril y Mayo.

236. *Symphitum tauricum*/ Willd. Enum Hort Berolin/ C in
R.H.M.

237. *Cerithe* (major) foliis ample-/ xicalibus, corollis obtusius-
culis/ patulis. P. B. de L. pr. Palau t^o. 2^o. 71./ *Cerithe* quorundam
major./ versicolor. T. Inst. R. H. 80. Flo-/ ra Española t^o. 4^o. pag.
143./ Esta planta se cria en mu-/ chas partes del circuito de Cor-/
doba, tanto en tierras de labor co-/mo en terrenos incultos: como en/
los olivares de la Galiana, en/ los Olivares del Obispo junto á la/
Alameda &c. es annua y florece/ en los meses de Primavera.

238. *Cerithe* major.

239. *Cerithe* Mayor L./ Entrena.

240. *Cerithe*/ aspera/ En las riveras del/ Guadalimar junto/ ó
frente de Veaz.

241. *Erica species*/ *Onosma*/ *simplicissima*/ W./ Fuen-cAliente.
242. *Onosma*/ *simplicissima*.
243. *Onosma echioides*.
244. *Pulmonaria angustifolia*/W.
245. *Echium*/ *italicum*.
246. *Echium italicum*/ W.
247. *Aretia Vitaliana*/ W.
248. *Primula* (veris) varietas. /*Primula* (elatior) Limbus corol-
larum planus. Lin. Sp. P. pr. pu.. tº. 2º. 108./ *Primulaveris* pallido
flore, elati-/or. T. I. R. H. 124. F. E. tº. 6º. 136./ *Primula Veris* altera.
C. B. Com./ Matthiol. super. Diosc. 802./ Esta Planta vegeta en
nuestra Pe-/ninsula: en los Pirineos, montes de Avila/ en Castilla
la Vieja &c. Quer. Se cul-/tiva en Cordoba en el Jardin del Obis-/po.
Es perenne, y florece en Marzo y / Abril, no grana semilla y se
propaga de/planta, en Cordoba. Se advierte en es-/ta *Primula* un
caracter bastante no-/ [reverso]: table, y es que al mismo tiempo
que levantan /sus escapos con las umbelas, arroja de la ra-/iz otras
flores sencillas, sostenidas de largos/ pedunculos: lo que no he
visto notado en nin-/guna descripcion; ni he advertido gravado en/
ninguna figura de quantas de *Primulas*/ he visto en diversos Auto-
res. Por lo que es-/toi dudoso en que esta sea la variedad pres-/
cripta, y me da lugar a sospechar sea esta/ otra variedad de la
misma especie, ó va-/riedad, de variedad tal vez, ó acaso sien-/do
este caracter constante podria constitu/ir especie distinta; lo que
no se puede de-/terminar si haver visto antes todas las/especies y
variedades de este Genero.
249. Creo ser la misma/ qe. se cultiva en los Jardines/ Canalica
812./*Primula veris*/ Esta es sin cultivo.
250. *Primula veris*. W.
251. *Lysimachia*/ *Linum stellatum*/Palau. tom. 2 pag. 130/ Esta
especie tiene la capsula/ de 5 ventallas/ [Reverso]: Se cria con
abundancia en / el río de los Molinos de Siles/ bajo la peña del
olivar en toda / la madre de dicho Río florece por / Mayo. La de-
terminó Entrenas.
252. *Anagallis Arvensis* L./ morulli./ Entrena.
253. *Anagallis Arvensis minima*./morelli.
254. *Anagallis*/Linifolia/Cabrera.
255. *Anagallis*.

256. *Plumbago* (Europae) foliis amplexi-/ caulibus lanceolatis scabris. Pract/Bot. de Lin. pr. Palau tº. 2º. pag. 146./ *Plumbago quorundam*. T. Inst./ R. H. 141. Fl. Esp.ª. tº. 5º. pag. 112./ Esta planta la he visto en mu-/ cha abundancia en las cercanías / de Carmona, y en todo el camino de/ allí á Sevilla donde la coxi: se cul-/ tiva en algunas partes de Cordoba./ Su raíz es perenne, crece de pie y/ medio á dos, y florece en el Estio.

257. *Convolvulus* (sepium) foliis sagittatis/ postice truncatis, pedunculis tetragonis u-/ nifloris. Lin. Sp. P. pr. pu. tº. 2º. pª. 155./ *Convolvulus major albus*. Tourn. Inst./ Rei Herb. 82. Flor. Españ. tº. 4º. pª. 402./ *Smilax laevis*. Lag. in Diosc. 463./ *Smilax laevis*, major. Dod. pemp. 392./ *Smilax laevis*. C. B. comment. Ma-/ ttiol super Diosc. 839/ Esta planta se cria cerca de Cordo-/ ba en el Arroyo del Moro, y en otros si-/ tios de esta naturaleza: crece del largo/ de siete ú ocho pies enredada entre los ar-/ busculos: su raíz es perenne, y flore-/ ce en los Meses de Julio y Agosto.

258. *Convolvulus Sepium*.

259. Class. V Pentandria Ord. Monoginia/ *Convolvulus Purpureus*/ Lin. Tom. 2º. pag.ª 159/ *Convolvulo Purpureo*/ (Vulgo) Marabillas.

260. *Convolvulus althæoides*.

261. *Convolvulus* (althæoidies) foliis cordatis sinuatis seri-/ ceis: lobis repandis, pedunculis bifloris. Pract. Bot. de Lin./ por Palau tº. 2º. pag. 167./ *Convolvulus peregrinus*, pulcher, folio Betonicae T./ Inst. R. H. 85. Flora Española tº. 4º. pag. 405./ Esta especie se halla mui frecuente en los paredones/ y laderas de los campos del circuito de Cordoba: su raíz es/perenne, sus tallos crecen á dos pies enroscados, ó postrados.

262. *Convolvulo de 5 lacinias*.

263. *Convolvulus lineatus*.

264. *Convolvulus Wheleri*/W.

265. *Convolvulo*/ rayado.

266. *Convolvulus*/ capitatus/ Cab. 237/ V. 3 de Julio.

267. *Ypomea quamoclit*.

268. *Campanula Patula*/ó / C.-Carece de ojas, y no/ se puede determinar la especie/ Entrena.

269. ¿*Campanula Patula*? / C./ Entrena. [Otra etiqueta]: *Campanula*/ Vngr.

270. *Campanula Patula* Cavs.
271. *Campanula/tenera* — *tiernecita*.
272. *Campanula* ó *Prismato/carpus porosa*.
273. *Campanula hybrida* [tachado *hybrida*]/ *prismato-/carpus/* Webb.
274. *Campanula Speculum/L.* /C in R H.M.
275. *Campanula speculum* [tachado *speculum*] /*hybrida* W.
276. *Campanula /hibrida*.
277. *Campanula Erinus*.
278. *Campanula Hispidula / rapunculus*.
279. *Campanula /erinoides/W*.
280. *Campanula/ mollis an Saxatilis?* [tachado]/ *erinoides* W
281. *Campanula/ Viznagar 3 de Julio/No se ve bien la/fig^a de las ojas*.
282. *Plumbago?/ Pentandria/ Estigma partido en 3/ 5 escamas cubren al germen/ Campanula/ Arroyofrio 17 Ag.to*.
283. *Campanula/ Vzgr. 20 Julio*.
284. *Campanula /velutina*.
285. *Campanula/microphila?*
286. *Campanula microphila? /de Cábanilles/ Amo 11 Jul*.
287. *Campanula /species nova?/Prismatocarpus species*.
288. *Campanula/ saxatilis W*.
289. *Trachelium Coeruleum/vulgo — Hermosilla*.
290. *Samolus* (Valerandi). Pract. Bot./ de Lin. pr. Palau. tº. 2º. pª. 234./ *Samolus valerandi*. T. Inst / R. H. 143. F. E. tº. 6º. pª. 249 / Esta yerba se cria con abundancia en Cordoba en las margenes de Guadalquivir, y en el Arroyo de Pedroches, y otros sitios bañados de Agua limpia. Es perenne y florece en Julio y Agosto./ La dan el nombre de Yerba de la Erisipela, por el uso que se hace de ella en esta enfermedad, aplicandola machacada, y curandola.
291. *Lonicera caprifolium*.
292. Class, quinta *Pentandria Ordo/ Monoginia/ Lonicera caprifolium/Linneo pr. Palau tº. 2º./pagª. 255 = Lonicera/ caprifolio (vulgo) Madre-selva*. Se cria abundantemente en la sierra de Cordova y esparce al el tpo de estar florida un suave y agradabile olor a lar-ga distancia pr/ lo que se seria apreciable en los jardines =/ virtudes/ Sus ojas son vulnerarias y detersibas y/el agua destilada de / sus flores quita la inflamacion de los ojos/ ved a/Linn.pr./ Pal. tº. y/p.citada.

293. *Lonicera periclymeno*.
294. *Lonicera Periclime/num*.
295. *Mirabilis* (Jalapa) floribus congestis termi/nalibus erectis. L. d. P. pr. pu. tº. 2º. pª. 274./ *Jalapa* flore purpureo. Tourn./ Inst. R. H. 129. Fl Esp. tº. 5º. pª. 257./ *Solanum Mexicanum*, flore mag/no. C. B. P. 168 / *Admirabilis* perviana, flore varii/ coloris albo rubicunda. (Et altera species)/ Swent. Florileg. lib. 2º. fol. 24 / vulgo Don Diegos ó Juanes de noche y, en/ Cordoba Don Pedros./ Esta planta havita en una y otra/ India: se cultiva en toda España: en Cordo/ba en todas partes, por la variedad y her/mosura del color de sus flores, varia tam-/bien de magnitud pues la hai enana./ Crece a la altura de tres pies mui ramosa/ su raiz es perenne: florece en el verano.
296. *Coris monspeliensis*/W.
297. *Verbascum/ thapsus* W.
298. *Verbascum phoeniceum*/ 29 de Mayo a la subida/ de S. Estevan junto al Conv.to/ de S. Francisco, y vi otras/ dos plantas á la salida/ de Andujar por la tro-/cha, y no he visto otras/ es planta mui bonita.
299. *Verbascum blataria*/ Mi amado y querido Jose no/ puedes tener una ydea de lo qe./ me an conplasido tus dos cartas/ y saber te allas bien disfrutan/do de una completa salud esto... [Reverso]: ente qe. pueda causarte la me/nor incomodidad fueras a ma/drid y tu bieras el gusto de ber a/ tus amigos y despues te binie/ras con el generar esto no qui/ta para qe. tu con mas conosimi/ento agas lo qe. mejor te acomo/des pero tu benida no quiero/...
300. *Datura* (Stramonium) pericarpi-/is spinosis erectis ovatis, foliis ova-/tis glabris. Pract. B. de L. pr. P. tº. 2º./ 288./ *Stramonium* fructu spinoso, ob-/longo, flore albo. T. Inst. R. Herv./ 119. Flora Esp. tº. 6º. pª. 336./ *Solanum foetidum spinosum*/ c. B. com. Mat. in Diosc. 228./ Esta planta dicen ser originaria/ de America; pero se halla connatura-/lizada en nuestra Peninsula: en/ Cordoba se cria con abundancia en/ las orillas del Rio, particularmente/ desde el arenal hasta el Molino de/ Martos. Crece de quatro pies de alto:/ es annua, y florece en los meses de/ Julio y Agosto.
301. *Datura* (Metél) pericarpiis spi-/nosis nutantibus globosis, foliis/ cordatis subintegris pubescentibus./ Pract. Bot. de Lin. pr. Pal. tº. 2º. 290./ *Stramonium* fructu spinoso./ rotundo, flore albo simplici. T. Inst./ R. H. 118. Flora Española tº. 6º. 337 / *Stramonia*. Lag.

421./ Esta especie he visto cultibada/ en el Jardin Botanico de Sevilla/ donde coji este esqueleto: despues la/ he obserbado en Cordoba en la/ orilla del Rio al lado de alla de la/ ciudad, mas arriba de la Zua; lo que estrañe. en el año de 1793.

302. *Datura Arborea* Cav.s./ En cambio de la *Catalpa/ ternifolia* Cavs. qe. creo es la/ qe. me remitió.

303. Class. V Pentandria Ord. Monoginia/ *Hiosciamus Albus/* Linn. Tom. 2º. pag. 293/ *Hiosciamo* blanco (vulgo) Beleño blanco.

304. *Hyoscyamus Physaloides/* Linn./ C in R H M.

305. Class. V Pentandria Ord Monoginia/ *Nicotiana Tabacum/* Linn. Tom. 2º. pag. 298 *Nicociana/* Tabaco (vulgo) Tabaco/ Havi-
taba solo en America hasta qe. Nico-/cio la introdujo en Europa

306. *Nicotiana*. (Rustica) foliis petiolatis ova-/tis integerrimis, floribus obtusis. Lin./ Sp. Plant. pr. pu. tom 2º. pag. 299./ *Nicotiana* minor. T. I. R. H. 117./ *Hyoscyamus tertius* C. B. comm./ Matth. super. Diosc. 750./ vulgo: Tabaco fino ó tabaco pequeño./ Esta planta es originaria de la Ame-/rica como todas las dems especies de este/ Genero; y esta mui estendida en Cordoba [tachado Cordoba]/ Euro-
pa: en Cordoba se halla en muchas casas/ donde la conocen por aquel nombre vulgar./ Es annua, crece de dos pies de alto, y flore-/
ce en los Meses de Julio y Agosto.

307. *Atropa* (Belladonna) caule herbaceo,/ foliis ovatis integris. L. S. P. pr. pu. tº. 2º. 302./ *Belladonna* majoribus foliis, et/ floribus. T. I. R. H. 77. F. E. tº. 3º./ 203.º *Solanum* lethale. Dod. pempt. 456/ *Solanum* somniferum. Swert flo-/rileg. lib. 2.º fol 20./ *Solanum* majus sive herva Bel-/ladonna C. B. comm. Mat. sup. Diosc. 756 / Es-
ta planta se cria en España en te-/rrenos incultos, desiertos, y som-
brios: en el/ monte de ntra. Sra. de Monserrate: & c./ Quer. La he
cultivado en Cordoba y he/ remitido semilla de ella al Jardin Bo-/ta-
nico de Sevilla. Es perenne, crece de/ quatro pies de alto, y florece
por Junio./ Es narcotica y venenosa: sus frutos comi-/dos matan, y
se socorre este peligro con/ los acidos vegetales, como el de Li-
mon & c.

308. *Nicandra physaloides*, W./ *Atropa physaloides* (Lin).

309. *Atropa Physalodes*.

310. *Physalis*...?: Entrena.

311. *Solanum/?* *Physalis somnifera* L?/ no hai fruto pr. lo qe-
dado/ Entrena.

312. *Physalis* (somnifera) caule fruticoso, / ramis rectis, floribus confertis. Lin. Sp. / Plant. pr. pu. tº. 2º. pª. 306. / Alkekengi fructu parvo, verticilato / Tour Inst. R. H. 151. Fl. Esp. tº. 2º. 244. / *Solanum somniferum*. Dod. pempt. 455. / En Cordoba Orabale. / Se cria en Andalucia, y señaladamen-te en Malaga. Se cultiba en Cordoba en/ muchas casas, donde hacen mucho uso de/ las hojas para las ulceras de las piernas. / Crece á la altura de tres ó quatro pies, y/ es perenne, florece en el Verano.

313. *Physalis* (Alkekengi) foliis geminis inte-/gris acutis, caule herbaceo inferne ramoso. / Lin. Sp. Plant pr. pu. tº. 2º. pª. 310. / Alkekengi officinarum. Tourn. Inst. R./Herb. 151. Flora Española tº. 2º. pª. 222. / *Solanum vesicarium* Dod. pempt. 454 / *Solanum Halicacabum*. Lag. in Diosc. 419. / C. B. com. Matth. sup. Diosc. 754. Swert/. Florileg. lb. 2º. fol. 20 / vulgo: Vegiga de Perro. / Se cria en España en las viñas, y cercas som-/brias, particularmente en las de Castilla la Vieja/ y en el Real sitio de Aranjuez. & c. Quer. / Se cultiba en Cordoba; donde la he cultivado y he propagado. Produce los tallos de dos pies de largo, / y debiles, su raiz es perenne, y rastrera, florece por Ma-/yo y Junio. Su fruto tiene uso en la Medicina.

314. *Physalis* Angulata Lin./C in R H M.

315. *Physalis* tuberosa Cavs./ C in R H M.

316. *Solanum* (diphylum) caule inermi fruticoso, foliis geminis, altero minore, flo-/ribus cymosis. Lin. S P. pr. pu. tº. 2º 315 / An: Rubrum? / Esta Planta fue traída á Cordoba/ el Año de 1790 remitida por D. Pedro/ gutierrez Troncoso Boticario en el Pu-/erto de Sta. Maria, con el nombre de/ hierva de la abundancia. / Produce el tallo angular y ahorquillado, /perece en el invierno ó a lo menos padece/ mucho en el, segun la graduación del frio. / Florece por Septiembre y Octubre/ crece á la altura de tres pies.

317 Class V Pentandria. Ord Monoginia/ *Solanum Dulcamara*/ Linn. Tom. 2º. Pagª 315/ Solano dulce-amargo.

318. *Solanum dulcamara*/ varietas β .

319. *Solanum* (Dulcamara) caule inermi fru-/tescente flexuoso, foliis superioribus hastatis, / racemis cymosis. L. Sp. P. pr. pu. tº. 2º. pª. 315. / *Solanum scandens*, seu Dulcamara. T. / Inst. R. H. 149. F. E. tomo 6.º pª. 316. / *Dulcamara*. Dodon pempt. 402. / en Cordoba: vulgo Yerva de la cuchillada. / Esta Planta se halla en las cercanias/ de Cordoba en sitios umedos: en la desembocadu-/ra del Arroyo Rabanales al Rio, Soto de quema-/dillas &c y en la Ciudad la tienen eu

mu-/ chas casas, donde hacen uso de ella en las/ heridas por lo que le dan aquel nombre./ Sus tallos crecen echados del largo de / diez ó doze pies: es perenne y florece en / Mayo y Junio.

320. Class. V. Pentandria Ord Monogina/ *Solanum Licopersicum*/ Linn Tom. 2º., pag.ª 319 / Solano Licopersico (vulgo) Tomates.

321. *Solanum Nigrum*/ Entrena.

322. *Solanum* (Sodomeum) caule aculeato fruticoso/ tereti, foliis pinnatifido-sinuatis sparse acu-/ leatis nudis, calycibus aculeatis. L. S. P. pr. pu./ tomo 2º. p.ª 329 / Habita en Africa. Linneo./ Este Solano se cultiva en los Jardines/ Botanicos de España; fue venida su semi-/ lla á Cordoba el Año de 1792 enviada / por don Pedro Abat, Catedrático de Bota-/ nica del Jardin de Sevilla./ Crece a la altura de tres ó quatro/ pies: es perenne, y florece en los Meses/ de Abril Mayo, y Junio: sus frutos son/ del tamaño de Nueces, y estan maduros en / el Ynvierno

323. *Solanum Cornutum*/ Lamark/ C in R H M.

324. *Lycium* (Barbarum) foliis lance-/ olatis, calycibus subbifidis. Pract./ Bot. de Lin. pr. Palau tº. 2º. p.ª 345./ Habita en Africa y Europa. Pal./ Esta especie de Lycio es un Ar-/ busto endeble que crece de tres / á quatro pies poco mas ó menos/ mui poblado de ramas: es peren/ ne y florece en el estio./ Hallelo cultivado en el Jar-/ din Botanico de Sevilla, en/ donde coji este esqueleto, año/ de 1793.

325. *Lycium* (Europaeum) foliis obli-/ quis. ramis flexuosis tere- tibus./ Practica Bot. de Lin. pr. P. tº. 2º. 346./ vulgo Cambronera./ Este Arbusto se halla en las / inmediaciones de Cordoba formando/ ballados, por la espesura de sus ra-/ mas armadas de agijones. Crece de/ cinco á seis pies de alto, es peren/ ne, y florece en Agosto y Sep- ti-/ embre.

326. *Chironia Spicata* (Wildenow).

327. *Chironia Spicata* W./ Entrena.

328. *Chironia Centaurium* (Wild).

329. 32. H/ Ramus infectorius ¿/graine d'avignon.

330. ¿*Rhamus Frangula*?/W.

331. *Rhamnus* (Alaternus) inermis, floribus dioicis, stigma-/ te triplici, foliis serratis. Pract. B. de Lin pr. Pal. tº. 2º. p.ª 385./ *Alaternus*. I. (et. II) Clus. histor. 56. T. Inst. R./ H. 595. Flora Española tº. 2º. pag. 200. *non videatur ejus figª*./ Este arbusto se cria en Cordo- ba en varias partes de / su Sierra, y le tengo observado, en los Va-

llados de los Palacios/ de la Galiana el sexo femenino en distinto pie que el masculi-/no. Crece á la altura de un hombre ó algo mas, es peren-/ne y florece en los meses de Febrero y Marzo.

332. Rhmanus alaternus W./ seu Philica elatior Bauh./ 20 de Marzo.

333. Romnus Alaternus/ Cabrera.

334. Ramno espina de / Christo / de 5 ojuelas.

335. Rhanus Zizifus / Vulgo-Azofaifo.

336. Rhamnus Hispanicus, folio Buxi,/minor. T. 593. Q. tº. 6º. pag. 199./ vulgo: Tamujos. Cordubae.

337. Rhamus/ licioides.

338. Ribes rubrum/ Grosellero/ Caban. p. 380/ Jaen Hacienda del Doctoral.

339. Lagoecia cuminoides.

340. Celosia (coccinea) foliis ovatis stric-/tis inauriculatis, caule sulcato, spicis/ multiplicibus cristatis. Pract. Bot./ de Lin. pr. Palau tº. 2º. pª. 461./ Amaranthus panicula incurva./ T. I. R. H 235. F. E. tº. 2º. pª. 283./ Amaranthus holosericus sangui-/neus reticulatis floribus. Swent. Flo-/rileg. lib. 2º. fol. 21 / en Cordoba: vulgo Borlas./ Habita en la India. Lin / Se cultiva en España: en Cordoba / en todos los Jardines, y casas particulares, / por su color, y varia disposición de sus cres /tas, las he visto formando una perfec-/ta esfera de seis Pulgadas de diame-/ (reverso): tro. Crece á la altura de tres ó quatro / pies, es annua, y florece en lo Meses/ de Agosto, y Septiembre.

341. ilecebrum...

342. Illecebrum cymosum /W.

343. Illecebrum (Paronychia) floribus bracteis nitidis obva-/llatis, caulibus procumbentibus, foliis laevibus. Pract./ Bot. de Lin. pr. Palau tomo 2º. pag. 467./ Paronychia Hispanica. T. I. R. H. 507. Quer/ Flora Española tº. 6º. pag. 63.=vulgo: *Sanguinaria* / Esta se cria en el circuito de Cordoba, en te-/rrenos guijarrosos, y en los caminos, como en toda la cu-/ esta de la Asomadilla. &c. su raiz es pne. florece en Mº.

344. Illecebrum capitatum/ Siles de Segura 812.

345. Illecebrum/ polygonoides/W.

346. ilecebrum/ alsinefolio/W.

347. Illecebrum Cimosum/ Cabrera.

348. Esta planta qe. Vmd me dio p^a. deter-/minarla y qe. sospe-
chaba Vmd se un / Plumbago, es el / thesium Linophylum. L /varie-
tas α mui bien./ Clase 5^a. Ordñ. 1°. flors. incompletas.

349. Vinca major/Vinca (minor) caulibus procum-/bentibus, foliis
lanceolato-ovatis, / floribus pedunculatis. Pract. Bot. / de Lin. pr. Pal-
su tom. 2°. pag. 492 /Pervinca vulgaris, angustifo-/lia, flore coeruleo.
T. Inst. R. H. / 120. Flora Esp. tom. 6°. pag. 82./ Clematis prima. C. B.
com / Matthiol. sup. Diosc. 679. / Clematis Daphnoides. Dodon /
pempt. 405./ Clematis. Lag. 380. [Reverso]: Farm. Vincapervinca./
vulgo: Yerva Doncella./ Esta planta se cria en Cordo-ba en el arro-
yo de las peñas detras/ de la Huerta del Naranjo, en el de/ Pedro-
ches detras del Molino del pa-pel con mucha abundancia, y en/ todos
los arroyos, Huertas y sitios/ humedos de la sierra. Produce los/
tallos mui largos, tendidos por tier-ra, es pe. y florece pr. Abril, y
sigue.

350. Ceratonia Siliqua.

351. Atriplex Laciniata L./Entrena.

352. Asclepias nigra/ Vzgr. [Otra etiqueta]: Sí es lo qe. creo pr.
la oja/ Lo tengo Deter/minado por/ Apocynum Venetum/ y lo vere-
mos fresco./ Entrena.

353. Asclepias Syriaca [tachado] Syriaca)/ fruticosa.

354. Class. V Pentandria Ord. Diginia/ Stapelia Variegata/Linn.
Tom. 2°. pag. 568/ Estapelia de varios colores. [Otra etiqueta]: Sta-
pelia Variegata./ Foliculos.

355. Chenopodium urbicum.

356. Chenopodium rubrum.

357. Chenopodium Murale (Lin).

358. Chenopodium hybridum.

359. Chenopodium urbicum Lin/ó/Chenopodium híbridum Lin/
Son muy parecidas algunas /especies de este genero de/ modo qe.
tal vez seran solo/ variedades.

360. Chenopodium Hybridum L./ Entrena.

361. *Chenopodium* (Botrys) foliis oblongis sinuatis, race-/mis
nudis multifidis, Pract. B. de L. pr. Pal. t°. 2°. pag. 580./*Chenopodium*
Ambrosioides, folio sinuato. T. Inst./ R. H. 509. Flora Española t°. 4°. pag. 223./ *Botrys*. Lag 346. C. B. com. Mat. 620. Dod. pem. 34./
Esta planta es comun en el circuito de Madrid y otras/ partes de
España. Qer. La he cultivado en Cordoba/ algunos años: es annua
y florece en Julio y Agosto.

362. *Chenopodium*..?/ ambrosioides/botris W./ foliis lanceolatis/
integris.
363. *Chenopodium*/ Ambrosioides./ the de España.
364. *Chenopodium* Scoparia L./ Entrena.
365. *Chenopodium* albicans/ vulgaria.
366. *Salsola* (*Tragum*) herbacea, erecta, foliis su-
bulatis spino-

Secunda Dianoria Ordo
 Montuma
 Salvia officinalis. Linn. Fono
 2^o p. r. Salvia p. r. 128
 Salvia officinal

los pelambres,/y en la Ysla de los Molinos por bajo del Puente. Es annua y florece en los Meses/ de Julio y Agosto.

367. *Salsola tragus* L.

368. *Gomphrena* (Globosa) caule erecto, foliis ovato-lanceolatis, capitulis solitariis,/ pedunculis diphilis. Lin. Sp. P. pr. pu. tº. 2º. 603./ *Amarantoides*, lychnidis folio, capitulis purpureis. T. I. R. H. 654. Flora /Española tom. 2º. 281./ vulgo: Siemprevivas encarnadas./ havita en la India. Lin./ Se cultiva esta Americana plan/ta en los Jardines de España: en Cor-/doba esta mui estendida, y asi la hai/ en todas partes. Varia con las cabezuelas/ blancas ó de color de Plata. Es annua,/ crece a la altura de pie y de medio, florece/ en los Meses de Julio, Agto. y Septiembre.

369. Almotesa ú olmo.

370. *Eringium*

371. *Eringium tricuspidatum* / W.

372. *Eringium tricuspidatum* / W.

373. *Eringium* /Maritimum /Cabrera

374. *Eryngium* (Campestre) foliis radicalibus ample-/xicalibus pinnato-lanceolatis. Pract. Bot. de L / pr. Palau tº. 2º. pag. 641. *Eryngium* vulgare. T. I, R. H. 327. Fª. Eª V 82./ *Eringium*. Lag. 279. =montanum. C. B. com. 505./Esta se cria en los campos del circuito de Cordoba, la/ llaman vulgarmte *cardo cuco* y corredor: su raiz/ es perenne, florece en los meses de Mayo y Juº.

375. *Eringium coeruleum* (tachado *coeruleum*)/ *Ametistinum*/ 55 H.

376. *Bupleurum* / *Rotundifolium*.

377. *Bupleurum* / *rotundifolium*.

378. *Bupleurum* (*rotundifolium*) invo-/protractum Link./ lucris universalibus nullis, foliis/ perfoliatis P. B. de L. pr. P. tº. 2º. 654./ *Bupleurum* perfoliatum,/ *rotundifolium*, annum. T. Inst./ R. H. 310. Flora Esp. tº. 3º. 332./ *Perfoliata*. C. B. com. Mat./ super Diosc. 805. Dod. pempt. 104./ Esta planta se cria entre los/ sembrados, de las inmediaciones/ de Cordoba, particularmente/ en los de hacia la Alameda. Es/ annua, y florece en Mayo y Jº.

379. *Bupleurum rotundi-/ folium* / 25 H.

380. *Bupleurum* / *Odontites* /Cabrera. [Otra etiqueta]: *Bupleurum Semicompositum* /Entrena. [Otra etiqueta]. *Bupleurum*?/33/C.

381. *Bupleurum* /*fruticosum*.

382. *Bupleurum* (Fruticosum) frutescens,/ foliis obovatis integerrimis. Pract. Bot./ de Lin. pr. Palau tº. 2º. pag 662./ *Bupleurum* arborescens, Salicis-/ folio T. Inst R. H. 310. Flora España-/la tom. 3º. pag. 334 / *Seseli* Aetiopicum ex frutex./ Dodon. pempt 312./ Esta especie se cria en el Reyno/ de Cordoba junto á Baena: la he/ visto cultivada en el Jardin Botanico/ de Sevilla donde coji este esqueleto / Es perenne, y crece á la altura de/ un hombre poco más ó menos, mui/ poblado de tallos.

383. *Bupleurum*...? /frutescens / 23 L.

384. *Torilis antriscus*.

385. *Caucalis* Daucoides.

386. *Caucalis* (Daucoides) umbellis trifidis aphyllis, umbe-/ llulis trispermis triphyllis. P. B. de L. pr. Pal. tom. 2º pag. 675./ *Caucalis* Monspeliaca, echinato magno fructei. T. I./R. H. 323. Flora España-/la t.º 4.º pag. 98. est.º?/ Esta planta se cria en los campos de labor del circuito de/ Cordoba: es annua Haunque de aquellos caracteres especificos/ de *Jacquín* aplicados pr. Palau á esta especie se colige carecen/ de involucre universal; supone Lineo expresamente tenerlo/ quando la describe en su Sp. plant. 3. edic pag. 346. por/lo que me inclino á que la nuestra es la especie dicha, va-/riando en tener involucro universal y no tenerlo, como tambi-/en en el numero de las semillas, cullas variaciones parecº/ se observan en las mas de las especies de este Genero

387. *Caucalis latifolia*/Linn et Cabanilles.

388. *Caucalis* /latifolia /W

389. *Caucalis* Arvensis. W.

390. *Daucus visnagoides* Entrena./ D. seminibus levibus, umbella uni/ versali basi coalita, involucro/bi- triphylo petala integra./ Vulgo visnagorro.

391. *Daucus* Visnaga L.

392. Class. V Pentandria Ord. Diginia. / *Daucus* Muricatus / Linn. Tom. 2º. pagª. 684/ Dauco con puntas rigidas.

393. *Daucus* muricatus.

394. *Daucus* Lucidus. W./ Es parecido al D. Mauritanico/ y al D Carota. Se diferencia del 1º. / en no tener flosculo central este/ril y del 2º. en la oja y peciolo/ lampiños.

395. *Daucus* Hispidus Entrena./ D. seminibus radi umbellule tribus/ hispidis, centrali vero tuberculosa,/ involucro universalis pi-

nato, partiali/que ternati, caule hispido tenuifolio./ Corrija Vmd el Latin.

396. Ammi Majus. W.

397. Conium / Dicotomum/ Cabrera.

398 Selinum (Carvifolia) caule sulcato/ acutangulo, involucreo universali eva-/nido, pistillis fructus reflexis. Pract./ Bot. de Lin. pr. Palau tº. 2º. 695./ Se cria esta planta en España/ en la Alcarria, Asturias, y otras/ partes. Vease á Palau./ Me dio este esqueleto en Sevi-/lla Don Anastasio Guzman, con/ aquel nombre generico y es-peci-/fico año de 1793.

399 34.H/ Athamanta cervaria?

400. 2ª. H/ Athamanta Mathioli W.

401. *Crithmum* (Maritimum) foliolis/ lanceolatis carnosis. Pract. Bot. de L./ pr. Palau tº. 2º. pag. 706./ *Crithmum*, foeniculum mariti-/ mum, minus. T. Inst. R. H. 317. Flo-/ Española tom. 5º. pag. 14./ *Crithmum* marinum. Dodon./pemp. 705./ *Crithmum* I. Casp. Bauhin./ comment. Mat. sup. Diosc. 381. Lag. 212./ Se cria en las costas del Mar/ Mediterraneo y Oceano en España./ vide Quer. La halle culti-/bada en/ el Jardin Botanico de Sevilla don-/de coji este esqueleto. año de 1793.

402. ¿Cachrys Panascifolia. W.? / Estoi muy dudoso en el nom-/bre de esta Planta, cuya semilla/ no está madura ni en estado/ de ver nada. Sube a la altura de/ un hombre y las ojas caulinas ter-/nadas.

403. *Ferula tingitana* L./ Como las ojas radicales y del/ tallo se habian secado podra / haber variación en la especie.

404. *Heracleum sphondylium*/ 35/H.

405. *Sium nodiflorum*, L. / Orilla del Manzanares.

406. OEnante / Prolifera.

407. *Phelandrium Acuaticuma* L.

408. ¿*Phellandrium Mutellina*? / No he visto la oja radical / pero la semilla es de *Phellandrio*.

409. *Coriandrium* (testiculatum) fructibus didymis. Pract /Bot. de Lin. pr. Palau tº. 2º. pag. 759 / *Coriandrum* minus testiculatum. T. Inst. R. H./ 316. Quer Flora Española t. 4º. pag. 427./ *Coriandri* altera Ircon. Dod. pempt. 302./ Esta especie se halla en los campos de Cordoba en ti-/erras de labor: es annua florece en Abril y Mº.

410. Cilantro / de testiculos.

411. *Scandix odorata*/W. [Otro ejemplar y otra etiqueta]: *Scandix*/ *odorata*.

412. *Scandix Pectenvenensis*. L.

413. *Scandix* (*Pectenvenensis*) *seminibus rostro longissimo*. P./ Bot. de Lin. pr. Palau tº. 2º. pag. 761./ *Scandix semine rostrato*, vulgaris. T. Inst. R. H./ 326. Flora Española tº. 6º. pag. 262./ *Scandix*. Lag. 222. C. B. com. Matth./ *Scandix Pecten Veneris*. Dod. pemp. 701./ Es mui comun esta planta entre los sembrados del cir-/cuito de Cordoba: es annua y florece en Abril y Mº.

414. *Scandix Anthriscus*/W /*Choerophilum Anthriscus*/Ventenat.

415. *Scandix*/ *australis*.

416. *Imperatoria* (*Ostruthium*) Lin. Sp. Plant. /pr. pu. tº. 2º. pª. 773./ *Imperatoria major*. Tourn. Inst. R. H./ 317. Flora Española tº. 5º. 270./ *Astrantia*. Dodod. pemp. 320./ Farm. *Imperatoria*./ Se cria en los Montes Pirineos de Cataluña, / en el Moncayo de Aragon, y en otros muchos / de nuestra Peninsula Quer. Es perenne: y / florece por Junio y Julio. / La he cultivado, y se cultiva en Cordoba en / la Alamea en el Hospital del Cardenal &c./ y en el Año de 1794 remití desde esta Ci-/udad á la de Sevilla, á Dn. Pedro Abat Cate-/drático de Botanica en la Sociedad Medica, / una Planta arraigada para aquel Jardin.

417. *Thapsia Asclepium*. L.

418. *Pastinaca opoponax*. W./ No tenia ya ojas.

419. *Smyrnum Perfoliatum* L./ En la bajada pª. el olivar de / Val de las huertas 19 Junio.

420. *Smirnum/perfoliatum*.

421. *Sium Repens* W [tachado *Repens* W] *Sium Nodiflorum* L. [Otra etiqueta dice]: *Anetum Segetum* L?

422. *Pimpinella Glauca*. L./ sera *Seseli pimpineloides*?

423. *Pimpinella* ahorquillada / *Orchis*.

424. *Viburnum tinus*. W.

425. *Viburnum* / *Thinus*/ Cabrera.

426. *Viburnum lantana*.

427. *Viburnum lantana* / W.

428. *Viburnum* (*Opulus*) *foliis lobatis, petiolatis glandulosis*./ Vs. *roseum*. Pract. Bot. de Lin. pr. Palau tº. 2º. pag. 829./ *Opulus* flore globoso. T. Inst. R. H. 607. Quer Flo-/ ra Española tº. 6º. pag. 18./ *Sambucus aquatica polyanthos*. C. B. com. M. 874./ Este arbusto se cria en los montes de Leon y Asturias:/Quer. y se cultiba en Cor-

doba en Jardines y casas particulares, la llaman *Mundo* por la disposicion globo/sa de sus flores, florece en los meses de Mzo. y Abril.

429. *Sambucus* (nigra) cymis quin-/que partitis, caule arboreo. Pract. / Bot. de Lin. pr. Palau tº. 2º. pª 835 / *Sambucus* fructu in umbel-/la nigro. T. I. R. H. 606. Flora/Española tom. 6º. pag 243./ *Sambucus*. C. B. com. Matth / sup. Diosc. 873. Lag. in eodem 887./ vulgo: *Sauco*./ Se cultiba en Cordoba el Sa-/uco, hecho arbol mui frondoso, en/ varias partes, como en el Hospi-/tal de Jesus, en la Alameda, y/ algunas casas particulares, flore-/ce en Mayo, y Junio,/ se hace uso de la/ flor en la/ farma-/cia.

430. *Tamarix Gallica* L./Entrena.

431. *Corrigiola Littoralis* / 23. H 20. C.

432. Le he contado 5 estambres 3 pistilos/ y aunque exactamte no están marcados/ todos las caracteres en el caliz y venta/llas de la caxa. me parece es el/ telephium oppositifollum. W./Examinela Vmd. tal vez variaran/ los estambres.

433. Podra ser la *Alsine Mucronata*/vea Vmd la nota de W. despues/ de la minuarta montana.

434. La Plantita tiene cinco estambres/ y 3 pistilos las anteras color de Lila/ y algo mellizas: En caso de no ser/ la *Alsine mucronata* es ena espe/cie nueva de este Genero.

435. *Alsine* (Media) petalis bipartitis, foliis ova-/to-cordatis. Pract. Bot. de Lin. pr. Pal tº. 2º. 853./*Alsine media* T. I. R. H. 243. F. E. tº 2º. 257./*Alsine*. Lag. 432. C. B. com. Mat in D. 782./vulgo *Pamplina*./ Esta planta es harto comun en Cordoba en/ las huertas, Jardines, y todos los sitios humedos/ de la ciudad: es annua y florece en Marzo y Al

436. *Parnasia palustris*/Boissier [véase 623. *Oxalis nov. sp.*]

437. *Statice Armeria*.

438. *Statice armeria* v. β . / alliacea.

439. *Statice armeria*.

440. *Statice limonium/armeria*.

441. 24. L./*Statice echioides*.

442. *Statice iuniperifolia* W./ coespitosa. Caban.

443. 36 *Statice dechotoma*/Cabanilles H /*Velezia rigida*.

444. *Staticeae Ferulacea*/Cabrera.

445. *Statice ferulacea*.

446. *Statice* (sinuata) caule herbaceo, /foliis radicalibus alternatim pinna-/to-sinuatis, caulinis ternis trique-/tris subulatis decurrentibus. Pract./Bot. de Lin. pr. Palau tº. 2º. pª. 876 / *Limonium* peregrinum, fo-/liis Asplenii. T. Inst. R. H. 342. /Flora Española tom. 5º. pag. 353. / Se halla esta planta en Ali-/cante, Reino de Valencia, cerca de/ Malaga, de Cadiz y otras partes de/ Andalucía. Quer./ Coji este esqueleto del Jardin/Botanico de Sevilla. año de 1793.

447. [*Linum catharticum*].

448. [*Linum angustifolium*].

449. *Linum/usitatissimum* / se cria silvestre / en las costas del oceano.

450. *Linum tenuifolium*.

451. *Linum tenuifolium*/W.

452. *Linum tenuifolium*/v.

453. Lino azul/ de francia.

454. Lino de flor/amarilla-rosa.

455. *Linum flavum*?

456. *Linum strictum*.

457. *Linum strictum* (Cavans).

458. *Linum suffruticosum*.

459. *Linum/ suffruticosum*/W.

460. *Linum suffruticosum*?/ 36/H.

461. *Linum africanum*.

462. Pentandria/ Pentaginia / Samolus? /*Linum*/ 34/L.

463. *Crasula*. 18. C./ y *Sedum* [tachado y *Sedum*].

464. *Crassula rubens*/W.

Clasis/VI/ Hexandria / Ordo / Monogy/nia

465. *Narsisus Poeticus*, / Arroyo de las piedras / florece por 8bre.

466. *Narcisus pseudo Narcisus*/W/Dehesa del Oro - 12 Abril.

467. *Narcisus bicolor* L/Entrena.

468. *Narcissus* (Tacetia) spatha multiflora, nectario campanulato plicato truncato triplo petalis brevior, foliis/planis. Pract. Bot. de Lin. pr. Palau tº. 3º. pag. 43./ *Narcissus palidus*, circulo luteo. T. Inst. R. Herb./ 354. Quer Flora Española tº. 5º. pag. 477./ *Narcissus* I. C. Bauh. comment. Mat. sup. Diosc. 858./ Esta especie se cria con abundancia en sitios humedos de/ los campos de Cordo-

ba, como en la Albayda, en el Cerro/ de las hermitas y otras partes. florece en En°. y Feb°.

469. Hexandria. Monogynia./ G./ Narcissus/. De Narcisso, cierto Mancebo mui pagado de su belleza/ el qual segun fingen los Poetas se transformo en esta / Planta./ *Narcissus* (*Bulbocodium*) spata uniflora,/ nectario turbinato, petalis majore, geni-/talibus declinatis. P. B. de L. pr. P. t°. 3° 44./ *Narcissus montanus, juncifolius*. caly-/ce flavo. T. I. R. H. 356. F. E. t°. 5°. 478./ *Narcissus, Pseudonarcissus juncifolius*,/ tuba non fimbriata, flore flavescente./ Swert florileg. fl. 21./ Este Narciso se cria en las/Provincias de España: en Andalucia en-/ tre Sevilla y Lisboa./ Trage este esqueleto de Sevilla el /Año de 1793 donde me lo dio Dn. Anas-/tasio Guzman, entonces agregado á a-/quel Jardin Botanico. &tc.

470. *Narcissus* (Jonquilla) spatha multi-/flora, nectario campanulato brevi, fo-/liis subulatis. P. Bot. de L. Pal. t°. 3°. 45./ *Narcissus juncifolius*, oblongo/ calyce, luteus, major. T. Inst Rèi./H 355. Flora Española t°. 5° pag. 477./ Esta se halla en las campiñas/ de Cordoba en sitios humedos, y don-/de la he visto con mas abundancia/ es en la Ysla que formo mas arriba/ de Lope Garcia el Rio quando dexo a-/quel molino en seco. Se cultiba tam-/bien en la Ciudad pr. su vista y olor agra-/dable: florece en Enero y Febrero.

471. Narciso/ hermoso/ con lacinias/ en la campanilla/ 6 estambres/ iguales.

472. *Pancratium* (*Maritimum*) spata multi-/flora, petalis planis, foliis lingulatis./Lin. Spec. Plant. pr. pu. t°. 3°. pag. 47./ *Narcissus maritimus*. T. I. R. H./ 377. Flora Española tomo 5°. pag 478./ *Narcissus Pancratium maritimum*,/ flore albo. Swert. florileg. lib. 1°. fol 27./ vulgo: Narcisos./ Esta planta que havita en las cos-/tas maritimas del Oceano de Anda-/lucia, se cultiva en Cordoba en Jar-/dines, y Casas particulares. La dan va-/rios nombres, pero aquel es el mas frecuente. Florece por Julio y Agosto.

473. Amarillys Belladona.

474. *Allium Mollis*. L. S. P. 432./ Clase sexta orden Monoginia./ *Allium angustifolium*,/ umbelatum, album. T. Y. R. H. 385

Clasis/ VIII/ Octandria,/ Ordo/Monogy-/nia

475. *Allium*/Vzgr. 10 Julio. [Otra etiqueta dice]: Class 6.^a Hexandria Ordo/Monoginia/ *Allium Chamaemolis* /Linn. Tom. 3°. Lag^a. 86/ Ajo pequeño Moli.

476. *Allium clusianum*/W.

477. *Tulipa* (Sylvestris) flore subnutante, fo/liis lanceolatis. P. B. de L. pr. Pu. tº. 3º. 101./ *Tulipa* minor, lutea. T Inst. Rei/Herv. 376. Flora Española tº. 6º. 432./ Esta especie de *Tulipa* se cria en varias Provincias de España: en Anda-/lucía cerca de Carmona &c. Quer / Su raiz es perenne, bulbosa; y flo-/rece en los meses de Pri-




Figura 3.ª—Autógrafo de Rafael Entrena

mavera./ Trage á Cordoba, en el año de/ 1793 cebollas de ella, y este esqueleto,/ del Jardin Botanico de Sevilla

478. *Tulipa silvestris*?

479. *Tulipa* (Gesneriana) flore erecto, foliis ovato-lan-/ceolatis. Pract. Bot. de Lin. pr. Palau tº. 3º. pag. 101./ *Tulipa* praecox, lutea. T. Inst R H. 373. Qr. tº. 6º. 432./ *Narcissus* V. C. B. com. Mat. sup. Diosc 859./ *Tulipa* major. Dod. pempt./ Esta planta se cultiba en Cordoba en varios Jardines/ y casas particulares, yo la he cultivado tambien algu-/nos años. Fue traída á España de Capadocia año de/ 1559. segun Gesnero, á cuya memoria se consagra.

480. *Ornithogalum Pirenaicum* L.

481. *Ornithogalum umbelatum*/ W./ en la torrecita del Carrizal/ 28 de Marzo.

482. *Scila italica*/W.
 483. *Scila Peruviana*/ Entrena.
 484. *Anterico ramoso*.
 485. *Convalaria Mayalis*.
 486. *Convallaria Polygonatus*/ Fuente del Texo.

487. *Hyacinthus* (Nonscriptus) corollis campanulatis sex-/partitis apice revolutis P. Bot. de L pr. Pal. tº. 3º. 158./ *Hyacinthus* oblongo flore, coeruleus, major. T/Inst R. H. 344 Quer Flora Española tº. 5º. 237 / *Hyacinthus* non spicatus Dod. pempt. 216./ Se cria en varias partes de España: vease á Quer/ la cultibo en Cordoba, traxe sus bulbos del Jardin/ Botanico de Sevilla, en 1793. fe. en Abril.

488. *Hyacinthus* (Serotinus) petalis exterioribus sub-/distinctis, interioribus coadunatis. Pract. Bot. de/ Lin. por Palau tº. 3º. pag. 159./ *Hyacinthus* obsoleto flore. T. Inst. R. H. 345./ Quer Flora Española. tº. 5º. pag. 238./ Esta especie se cria en Cordoba en Peñataxa-/da y otros sitios de la Sierra: florece en Abril.

489. *Hiacintus Serotinus*/Lachenalia. [Otra etiqueta dice]: *Hyacinthus Serotinus*/ Cab./ Batan de Siles.

490 *Hyacinthus* (Orientalis) corollis infundibuliformis se-/mixfidis basi ventricosus. P. Bot. de Lin. pr. Pal. tº. 3º. 160./ *Hyacinthus* Orientalis major et minor. Dodon / pempt. 216./ *Hyacinthus* Orientalis alter. C. B com. Mat. 744./ Esta planta se cria ó mas bien se cultiba en los/ Jardines, y casas particulares de Cordoba: la llaman *Ja/-cintos*, su raiz es pe., florece en Mzo. sus corolas son azules.

491. *Hyacinthus* (Orientalis). Vs./ Estas variedades del Jacinto Oriental se cul-/tiban en Córdoba en el Jardin del Obispo y/ otros de curiosos: de la variedad blanca tra-/xe una cebolla de Jardin Botanico de Sevilla/ año de 1793. florece en Marzo y Abril.

492. *Hyacinthus Cymosus*.

493. *Hyacinthus* (Racemosus) corollis ovatis, summis ses-/silibus (rectius sterilibus) foliis laxis Pract. Bot. de/ Lin. pr. Palau tº. 3º. pag. 164./ *Muscari* arvense, Juncifolium, coeruleum, mi-/nus. T. Inst. R. H. 348. Flora Española tº. 5º. pag. 457./ He visto esta especie en la cerca de Peñataja-/da camino de Linares, y en algunos sitios de la Ala-/meda, y otros sitios cerca de Cordoba. florece en Abril.

494. *Hyacinthus Race/mosus*.
495. [*Juncus*.]
496. *Juncus filiformis*. L.
497. *Juncus Bulbosus*.
498. *Juncus buffonius*/H. 9.
499. *Juncus Jacquini*. L.
500. *Juncus Muricatus*/ Cabrera.
501. *Franquenian*/ Pulverulenta.
502. *Rumex /verticillatus*/ Cabrera
503. *Rumex Patientia*.
504. *Rumex crispus*/Lin.
505. *Rumex Pulcher*.
506. *Rumex bucephaloformis* /W.
507. *Rumex Vesicarius* Lin.
508. *Rumex Tingitanus* /Cabrera.
509. *Rumex Acetosa* /Azedera.
510. *Rumex / acetosella*/W.
511. *Rumex acetosella*. L./Venta del aspiroto. Sto
512. *Rumex*.
513. *Colchicum* (Autumnale) foliis pla-/nis lanceolatis erectis
Pract. Botan./ de Lin. pr. Palau tº. 3º. pª. 265./ *Colchicum commune*.
C. B. 67./T. 348. F. E tº. 4º. pª. 386./ *Colchicum*. Lag. 430. Dodon/
pempt. 460. C. B. com. Matt sup./ Diosc. 777./ *Colchicum vernal*
flore pur-/pureo. Swert. florileg. lbº. 1º. fol. 56./ Se cria esta planta
cerca de / Cordoba, en las torronteras del A-/rroyo de las peñas de-
tras de la Hu-/erta del Naranjo, en la Albayda,/ y en la Campiña
tambien. florece / en el Otoño, y arroja las ojas en el invierno.
514. *Alisma plantago*.
515. *Alisma* (Plantago) foliis ovatis/acutis, fructibus obtuse-tri-
gonis./Pract. Bot. de Lin. pr. Palau tº. 3º. 273./ *Ranunculus palustris*,
Planta-/ginis folio, ampliore. T. Inst. R/H. 292. Flora Española tº.
6º. 168./*Plantago aquatica*. Laguna en Diosc. pag 371/Coji este esque-
leto en el Jardin/Botanico de Sevilla en 1793. haunqe./ todabia no lo
he visto tengo noticia cierta de que se cria en Cordo-/ba en quema-
dillas./ Crece de dos á tres pies de alto. [Reverso]: Esta especie la
cogi en 1796 en el /canal de Manzanares, de donde pr /comision del
pr. Catedratico del Rl./ Heptandria. Monogynia. Jardin Botanico
D. Casimiro Orte-/ga lleve un zesped á dicho Jardin.
516. *Folium communis /magnitudinis*, AEs-/culi Hippocastani,/
petiolo dissecto.=/in 1794.

CLASE VIII.

Clasis/VIII/Octandria, Ordo/Monogy-nia

517. Octandria Monogynia / Tropeolum Peregrinum / vulgo-Cañarios.

518. Oenothera (mollissima) foliis lanceola-/tis undulatis. Lin. Spec. Plant. pr. pu./ tº. 3º. pª. 308 / Habita en el Campo de Buenos-ayres L./ Se cultiba en Córdoba esta exo-/tica planta en la Alameda de el Obis-/po, y en mi Hortulo Botanico tengo noticia de que su semilla vino á Cor-/doba de Sevilla. Es suavísima al tacto./ Es annua, ó dura dos Años, y/florece por Junio y Julio / Crece de la altura de un pies á dos.

519. [Oenothera].

520. Epilobium (hirsutum) foliis oppositis lance-/latis serratis decurrenti amplexicaulibus./ Lin Spec. Plant. pr. pu. tº. 3º pª. 313./ Chamaenerion villosum, magno flore./ purpureo. T. Inst. R. H 303. F. E. tº. 4º. 187./ Lysimachia siliquosa, hirsuta, magno flo-/re purpureo. C. B. Pin. 245./Lysimachia purpurea Fuchs 491./ Pseudolysimachium purpureum I. Dod./ Pempt. 85 / Este arbusto crece a la altura de un hombre, en las inmediaciones de Cordoba, como es/ en el Arro Pedroches, y en la Palomera, donde lo/he cojido, y en otros Arroyos y sitios de agua qe. /es donde abita Florece por Mayo y Junio.

521. Epilobium tetragonum/L./Entrena. [Otra etiqueta dice]: Epilobium/Vzgr. 20 Julio.

522. Epilobium tetragonum L.

523. Erica vulgaris/ vulgo - Brezo.

524. Erica foliis quaternis corollis ovatis/ coeruleis antheris muticis inclusis/ stilo exserto floribus spicatis/ no me atrevo á determinarla Vulgaris/ Se cogio en Fuencaliente / Erica vulgaris varietas 8 W.

525. Erica Vulgaris/varietas/ 7 W Cabrera.

526. Erica scoparia. W

527. Erica purpurascens/ umbria / W. /de Morote.

528. Dehesa de los Endrinales Sierra de / Alcaraz día 16 de Marzo de 1812./ Planta de 8 estambres 4 mas largos/ corola monopetala 4 drifida/ de un pistilo ovario de figura de huebo/ tubo cortísimo stigma en cabezuela./ Caliz comun de unas 6 ojuelas/ llaman-la Martin Polo/ Es purgante mordaz/ Daphne /mezereon.

529. Daphne mezereum/ W./ Royo frio y Sierra del agua.

530. *Dapne Dioica*.
 531. *Daphne Gnidium* (Lin).
 532. *Stellera passerina*/W / en Sbre. en la Palomera
 533. 18. H./ 2/ *Paserina nitida*/Pereon.
 534. *Passerina/ orientalis/ W*.
 535. *Acer/ platanoides./ W*.
 536. *Acer campestre. L./ C in R H M*.
 537. *Poligonum/ Bistorta/ Cabrera*.
 538. *Polygonum* (*Persicaria*) *floribus hexandris/ digynis, spicis ovato-oblongis, foliis lanceo-/latis stipulis ciliatis. L. Sp. P. pr. pu. tº. 3º. pª 428 / Persicaria mitis, maculosa, et non ma-/culosa. Tourn T. R. H. 509. Fl. Esp. tº. 6º., 79./ Persicaria. Dodon... pempt. 597./ Esta Planta se cria con mucha abundan-/cia en Cordoba en las margenes del Guadal-/quivir. y en qualquiera parte de la Ciudad, en/ sitios pantanosos. Crece á la altura de dos ó tres / pies, es annua y florece en Julio y Agosto.*
539. *Polygonum* (*Oriente*) *floribus heptan-/ dris digynis, foliis ovatis, caule erecto,/ stipulis hirtis, hypocrateriformibus./ Lin. Spec. Plant. pr. pu. tº. 3º. pª. 430./ Persicaria Orientalis, Nicotianae fo-/lio calice florum purpureo. Tourn. C. 38./ Flora Española tomo 6º. pª. 81./ Habita en Oriente y en la India. Lin / Esta Planta exotica, se cultiva en Es-/paña en los jardines de muchos curiosos, co-/mo lo dice Quer en su Flora Española; la/ vi la primera vez en Cordoba en el Jar-/din del Obispo á donde parece vino la semi-/lla de Madrid; la he cultivado; crece á la / altura de quatro pies, florece en Julio y Agosto.*
540. *Polygonum Aviculare* Lin.
 541. *Cardiospermum* (*Halicacabum*) *foliis/ laevibus. L. Sp. P. pr. pu. tº. 3º. pª. 448./ Corindum folio ampliore, fructu/ majore. T. I. R. H. 431. F. Esp. tº. 4º. 433./ Halicacabus peregrinus. Dodon./ pempt. 452./Vesicaria Repens. C. B. comm./ Matth. super. Diosc. 755./ Habita en las Indias. Lin./ Esta Planta es exotica y se cultiva/ en España: en Cordoba en muchas casas/particulares;unos la llaman *Bombitas*, / y otros *Farolillos*. El año de 1793 invie/ semilla de ella al Jardin Botanico de/ Sevilla. Crece agarrandose con sus cirros á/ los los cuerpos vecinos, de 5 pies de alto, florece en Julio. ☉*

Clasis./IX,/Enneandria/Ordo/Monogy-/nia

542. *Laurus* (*nobilis*) *foliis lanceolatis/ venosis perennantibus, floribus/ quadrifidis dioicis Pract. Bot. de/ Lin. pr. Palau tº. 3º. pag.*

462./ *Laurus vulgaris*. T. Inst. R./Herv. 597. Flora Esp. tº. 5º. pag. 319./ *Laurus*. Lag. in Diosc. 64. C. B./ com. Mat. 125. Dod. pempt. 849./ Se haya el Laurel en Cordo-/ba en muchisimas partes, y en ca-/si todas las Huertas de la sierra/ y en muchos arroyos de ella. Es Ar-/bol de 15. ps de alto, fle. en Mzo. y Abl.

CLASE X

543. *Anagiris foetida*.

544. *Cercis* (*Siliquastrum*) foliis cordato-or-/bicularis glabris. P. B. de L. pr. P. tº. 3º. 499./ *Siliquastrum*. T. Inst. R. H. 647./ Flora Española tom. 6º. pag. 296./ *Arbor Judae*. Dod. pempt. 786./ *Casp. Bauhin.* com. Matt. sup. Diosc. 171./ vulgo: *Arbol del Amor*./ Este Arbol se cultiba en Cordoba/ en la Alameda, de donde se han saca-/do/ varias plantas que se hallan en otros/ Jardines. Es mui corpulento y robusto,/ y en el mes de Abril, quando se halla/ despojado de oja, se cubre todo el de flos / encarnadas qe. ofrecen un aspecto agradable. [Otra etiqueta dice:] *Cercis Siliquatri*/ flos./ *Cercis Siliquastri*/ fructus.

545. *Cassia* (*Occidentalis*) foliis quin-/quejugis ovato-lanceolatis mar-/gine scabris, exterioribus majo-/ribus. glandula baseos petiolorum./ *Pract. Bot. de Lin. pr. Pal* tº. 3'. 511./ Habita en la Jamaica. Lin./ Coji esta planta en el Jar-/din Botanico de Sevilla año de / 1793, donde me dixeron ser la/ especie dicha.

546. A *Ruta muraria*/ con las cajas Maduras.

547. *Cassia Acuminata*? W / Entrena [Otra etiqueta dice:] *Cassiae quaedam species*. coxi esta especi de Casia en la Huer-/ta de los Padres Agustinos de Sevilla.

548. No es la *Robinia pseudo*/ *Acacia* / La creo *Cassia floribunda*/Cav.s / Entrena.

549. *Ruta* (*Graveolens*) foliis decompositis, floribus laterali-/bus quadrifidis. *Pract. Bot. de Lin. pr. Pal.* tº. 3º. pag. 538./ *Ruta sylvestris*, major. *Tourn. Inst. R. H* 257./ *Quer Flora Española* tº. 6º. pag. 228./ *Ruta*. Lag. in Diosc 298. *Casp. Bauhin.*/ comment. Matth 540.= vulgo: *Ruda*./ Esta planta se cria en la Sierra de Cordo-/ba, y donde la he visto con mayor abundancia es/ en los contornos del castillo de la Albayda./ es perenne y florece en Abril y Mayo.

550. *Ruta Linifolia*/Palau t. 3. p. 540 / [Otra etiqueta dice:] *Ruta linifolia* W. tomo. 2 pag. 544/ Unica mata que he visto, cogida/ el 2

de Julio entre la Puerta y/ Veas en el Valle de Guadalupe/ año de 1829.

551. *Melia* (Azedarach) foliis bipin-/natis. Pract. B. de L. pr. P. tº. 3º. 552./ *Azedarach*. Dod. pempt. 848./ T. Inst. R. H. 616. Flora Española tom. 3º. pag. 193./ *Pseudosycamoros* C. B. com./ Matthiol. super Diosc. 232 /vulgo: *Arbol del Paraíso*./ Este árbol se cria en Córdoba/ mui corpulento y frondoso, en la/ cerca de la Huerta Morales en/ frente de San Cayetano, y den-/tro de la Ciudad en la casa frente/ al colegio de la asumpcion, en/ el Convento de Religio-/sas Agus /finas de Sta. Maria de las Nie-/bes, y otros sitios y casas parti-/culares. Florece en Mayo y/ Junio.

552. *Tribulus* (terrestris) foliolis sexjugatis sub-/aequalibus, seminibus quadricornibus, Lin / Sp. Plant. pr. pu tº. 3º. pª. 567./ *Tribulus terrestris*, Ciceris folio, semi-/num integumento aculeato. T. Inst. R. H. / 266./ Flora Española tº. 6º pª. 412./ *Tribulus terrestris*. Dodon. pempt./ 557. Lagun in Diosc. 385./ vulgo Abrojos./ Sus tallos crecen del largo de un pie en/ contorno de la raíz echados sobre tierra: es/ anual y florece por Julio./ Se cria en abundancia en todos los al-/rededores de esta Ciudad, y dentro de ella/ como en el campo de la Merced, Marrubial,/ y en patios de casas grandes y calles poco pisadas.

553. *Saxifraga punctata*/W.

554. *Saxifraga* (Geum) foliis reniformi-/bus dentatis, caule nudo paniculato./ Pract. Bot. de Lin. pr. Palau tº. 3º. 640./ *Geum rotundifolium*, minus. T./ Inst. R. H. 251. F. E. tº. 5º. pª. 164./ *Saxifraga* iv. Casp. Bauhin./ comment. Matth. sup. Diosc. 694 / Esta planta se cria en Cordo-/ba, en la cuesta de trasierra suviendo,/ pasado el sitio que llaman el rebenton;/ en todo el cerro de la yzquierda, donde/ la he cogido, y visto repetidas veces./ Su raíz es perenne, brota en el/ Otoño, y florece en Abril y Mayo.

555. *Saxifraga* Geum.

556. Caliz adherente/ Decandria. Diginia/ Jenave Abril 812./ *Saxifraga*/ rotundifolia. [Otra etiqueta dice:] ¿*Saxifraga Granulata*?/ Entrena.

557. *Saxifraga* (Tridactylites) foliis/ caulinis cuneiformibus trifidis/ alternis, caule erecto ramoso. Pract./ Bot. de Lin. pr. Palau tº. 3º. pª. 648./ *Saxifraga verna*, annua. hu-/milior. T. I. R. H. 252. F. E. tº. 6º. 256 / *Paronychia altera*. Dod. pem. 113/. Esta plantica se cria en Cordo-/ba en las paredes viejas, y en al-/gunos patios enla-

drillados, como / en el del Argibe de Capuchinos, y/ en el del angulo grande de Sn. Ag.n/ es annua y florece en Abl. y M °

558. *Saxifraga tridactylites*/ W.

559. *Saxifraga* de Cespel.

560. *Saxifraga muscoides*. W./ Solo ese exemplar separado es/ por donde he podido determi/nar la especie, apesar de no/ estar mui seguro por el color/ q.e es blanco en la mia/ S Coespitosa. W.

561. *Gypsophila* (*Struthium*) *foliis line-aribus carnosis, axillaribus confer-tis teretibus*. P. B. de L. pr. P. tº. 3º. 660./ *Lychnis Hispanica*, Kali fo-/lio, multiflora. T. Inst. R. H. 338 / Flora Española tº. 5º. pag. 382./ Se da en los cerros de las Sa-/linas del Real Sitio de Aranju-/ez en terrenos incultos. secos, a/ridos y arenosos. La raiz es pe-/renne, y florece por Agosto. Qr./ Vi esta planta culibada en/ el Jardin Batanico de Sevilla/ donde coxi este esqueleto. 1793.

562. *Saponaria officinalis* Cav/ Entrena. [Otra etiqueta dice:] *Saponaria officinalis* Lin

563. *Saponaria officinalis*, L./Cabrera.

564. Xabonera / que se estiende/ porrigens W./ Dehesa del Oro.

565. [*Saponaria ocymoides*].

566. *Dianthus* (*Barbatus*) *floribus aggregatis fasciculatis, / squamis calycinis ovato-subulatis tubum aequantibus, fo-/liis lanceolatis*. Pract. Bot. de Lin. pr. Palau tº. 3º, pag. 670 / *Caryophyllus hortensis*, *barbatus*, *angustifolius*, (vel *lati-/folius*.) T. Inst. R. H. 332. Flora Esp.ª tº. 4º. pag. 74./ *Armerius flos alter*. Dod. pempt. 176./ Esta planta se cultiba en los Jardines y casas particu-/lares de Cordoba, y la dan la denominación de *Ramilletes*,/ pr. la disposicion de sus flores. es pe. florece en Mayo &tc.

567. *Dianthus/ carthusianorum/* Lin. Lag./ *varietas*.

568. *Dianthus Carthusianorum* / Entrena. [Otra etiqueta dice:] *Dianthi Species*.

569. *Dianthus Proliferus*. L./ [Otra etiqueta dice]: Cianela blauca. [Y otra etiqueta]: Dudo sea Cyanela porque/ le falta el carácter de tener/ un estambre doble largo que/ los otros: La planta está sin/ fruto ni ojas por lo cual se/ra aventurado cuanto se diga.

570. *Dianthus/ prolifer*. Lin/ Lag.

571. *Diantho clavellina/ Caryophyllus/W*.

572. Class. X Decandria Ord Diginia/ *Dianthi Cariophili/ varietas?* Linn. tom. 3º. pagª. 674 *Clavellinas*.

573. *Dianthus Deltoides* L./ Cº in H R M.

574. *Dianthus Chinensis* / Entrena. [Otra etiqueta dice]: Esta esp es / *Dianthus Chinensis* L./ Entrena.
575. *Dianthus Plumarius* L./ C in R H M.
576. *Dianthus* / *virginicus*/ W/ an *pungens*?
577. *Dianthus hispanicus*/ Asso. Lag.
578. *Diauthus carregianosum*
579. *Cucubalus*/Behen/Cabrera.
580. *Silene Lusitanica*? W/S. *Sericea* W.?./ Entrena.
581. *Silene Gallica* L/ La otra sera/ especie nueva./ Entrena.
582. *Silene Gallica*. L.
583. ¿*Silene cerastioides* L.?/ ¿*S. Gallica* L.?/ Entrena.
584. *Silene cerastioides*.
585. *Silene cerastioides* W.
586. *Silenes*?/ 10 C./ Cambron / 9 Julio. [Otra etiqueta dice]: *Silene*/ *paradoxa*/ *preciosa*/ hacia las juntas / de Guadalupe/ y Guadalupe.
587. *Silene paradoxa*?
588. *Silene Portensis* L/ Entrena. [Otra etiqueta dice]: *Silene*/ 11 G./ V. 5 Julio.
589. 73 Lag./ *Silene Viscosa* Cabrera/ Sp. nova. [Otra etiqueta dice]: Cabrera/ *S. Portensis*.
590. *Silene armeria*/ W/ *Saponaria*/ *ocymoides*.
591. *Silene saxifraga*.
592. *Silene*.
593. 34. *Silene* H.
594. *Silene*.
595. 33 *Silene* H.
596. *Silene ciliata*/ W.
597. *Stelaria holostea* W./ in rupibus — mense Junio — 29 — / en las riscas del Cerro del rayo/ y del arroyo blanquillo sobre/ Navalasna.
598. *Arenaria* / 9. C. 13. M H./ V. 8 de Julio. [Otra etiqueta dice]: *Arenaria tetraquetra* / *rubra*/ vars. β W./ Entrena.
599. *Arenaria*/ 12 H. 8. C./ Cambron/ 9 de Julio. [Otra etiqueta dice]: *Arenaria tetraquetra*/ L/*striata* [tachado *striata*] *pungens* L. Entrena.
600. *Arenaria serpilifolia*/ W/ 5. S.
601. *Arenaria rubra* / W.
602. *Arenaria rubra* / W.

603. *Arenaria media*.
604. *Arenaria* / *gypsofiloides*.
605. H/ *Arenaria* 19./ *saxatilis*.
606. *Arenaria saxatilis* / W./ *laricifolia*.
607. *Arenaria* / *iuniperina* /W.
608. *Arenaria* / *coespitosa* /W./ Rio molinos / an idem cum sequenti?
609. *Arenaria polygonoides* /W,
610. *Arenaria* / *recurva* /W.
611. *Arenaria*.
612. *Cotyledon Umbilicus*.
613. *Cotyledon hispanica*.
614. *Cotyledon hispanica* /W.
615. *Cotyledon viscosa*/ W.
616. *Sedum*(*Telephium*) *foliis planius-/ culis serratis, corymbo folioso, caule/erecto* Pract. Bot. de Lin. pr. P. tº. 3º. 750./ *Anacampseros*, vnlgº faba crasa./ T. I. R. H. 264. Flora Esp. tº. 3º. 17 / *Telephium alterum sive Crasula*. /Dodon. pempt. 130./*Fabaria* C. Bauhin. comm./Matthiol. in Diosc. 472./ Dice Don Josef Quer que se/cría en algunas partes de Andalu-/cia; pero no señala el Lugar. /Se cultiva en Cordoba en / muchas partes, y lallaman *Canji/-lona*. La usan para los callos de los pi-/es, y Grietas de los pechos. Crece de / un pie, es perenne, florece en Julio. [Reverso]: Tengo observada esta especie en Ca/taluña, junto á Calella á la parte / de la montaña/ en 1795.
617. *Sedum reflexum* [tachado rupestre].
618. *Sedum* de 6 angulos.
619. *Sedum Sexangulare* L. /Entrena. [Otra etiqueta dice]: 30 H / en Jaen/*Sedum*/acre.
620. *Sedum atratum*/W.
621. *Oxalis Acetosella* L./ Entrena.
622. *Oxalis* (*corniculata*) *pedunculis umbelliferis, caule ra-/moso diffuso*. Pract. Bot. de Lin pr. Palau tº. 3º. pag. 771./ *Oxys lutea*. T. Inst. R. H. 88. Flora Española tº. 6º. 42./ *Tritolium acetosum luteu*. C. B. com. Mat. 608./ Esta planta es harto comun en los Jardines, y tierras/ cultibadas de Cordoba: se esparce mucho sobre la tierra / á causa de producir sus tallos raices, á trechos; por lo que /no es fácil esterminarla. Espe. florece en Abl. y Mayo.
623. En el año de 1812 coji esta planta en / el viznagar junto á la fuente que llama/ban del pino, é hize de ella la descripcion/ si-

guiente./ Caliz libre de 5 lacinias profundamente/ henchidas hasta su base./ Corola de 5 petalos./ Estambres 5 y otros 5 alternos de cada uno / de los quales sale un hacecito de filamentos/coronados por unos globulitos que no se si /seran antheras./ Germen aovado. 5 estigmas sentadas/ una caja de 5 ventallas y 10 celdas /semillas menudisimas. / Reflexionando sobre el caracter de las / antheras asurcadas y persuadido á qe. los / filamentos de los 5 estambres mas cortos /pueden ser las paredes ó ventallas de las /antheras ya abiertas: y tambien á qe. / abriendose las ventallas de la caxa en dos /por el dorso pudo parecer caja de 10 cel-/das me inclino á creerla una espe-/ [reverso]: cie nueva de *Oxalis* pues en este / caso solo varia del caracter generico / en tener los estigmas sentados sin / estilo vease Caban. n°. 1111./ Yo no la he visto fresca / Pero en vista de lo que /Vmd dice tal vez sera / la *Oxalis rostrata* W. ó la *O Lepida* unica/ especies de ojas simples./ es lastima no tener mas/ exemplares, p^a examinar/la bien. Puede Vmd ver el Sonnini /*Parnasia palustris* /Boissier.

624. *Oxalis cernua*.

625. *Agrostemma Gitago*.

626. *Agrostemma Jitago*.

627. *Agrostemma Corona-ria*.

628. *Lychnis* (*Chalcedonica*) *floribus/ fasciculatis fastigiatis*. Pract. Bot./ de Lin. pr. Palau. t°. 3°. pag. 779./ *Lychnis hirsuta*, flore incar-/nato, major. T. I. R. H. 334./ Flora Española t°. 5°. pag. 382./ *Flos Constantinopolitanus*./ Dodon. pempt. 178./ Esta planta habita en Rusia/ y se cultiba en los Jardines de Cor-/doba, su raiz es perenne, crece de/ dos á tres pies, y florece por Ju-/nio y Julio. Le tengo obserbada/ la capsula de una celdilla.

629. *Cerastium vulgatum* /L.

630. *Cerastium viscosum* / W. / Rio molinos.

631. *Cerastium semidecandrum?* W./ Stamina 8. Stili 5. petalis bifi-/dis, calice brebioribus in eo/obserbavi.

632. *Cerastium Dichotomum* / 21. C.

633. *Cerastio apretado* / *Cerastio apretado* / en las rocas de Segura.

634. *Cerastio* / apretado.

635. Planta curiosa que debe/ buscarse para determinarla./ No es necesario buscar otra pues aunque/ con bastante trabajo, remojando en agua/ dos capullos qe. tenia pude contarle los /7 estambres ó mas y los 5 pistilos./ *Spergula Arvensis*. W.

CLASE XI

636. Euforbia/ Serrata/ Cabrera.
 637. Euphorbia spatulata W./ Especie mui rara en esta/Wilde-
 now la pone como exótica pero yo /estoi en qe. es esta especie ú
 otra nueva/ Siempre es planta curiosa.

Clasis/ XII/ Icosandria/ Ordo/ Monogy-/nia

638. Class. 12 Ycosandria Ord. Monog./ Philadelphus Corona-
 rius/ Linn. p. P. Tom. 4 Pag. 127/ Philadelpho de coronas (vulgo)
 ge-/ringuilla/ en Cordovà lo llaman Celinda
 639. G. Philadelphus/ De Phyladelpho Rey de Egypto./ Phila-
 delphus (Coronarius) foliis sub-/ dentatis. P. B. de Lin. pr P. tom.
 4º. 127./ Syringa alba, seu Philadelphus/ Athenaei. T. Inst. R. H.
 617. Flora/ Española tom. 6º. pag. 345./ vulgo: Zelinda.../Este Arbus-
 to dice Linneo se/ cria en Alemania y Suiza. Se cul-/tiba en Cordo-
 ba en muchisimas par-/tes, donde le dan aquel nombre. Sus / flores
 gozan un subidisimo y agrada-/ble aroma: crece á 7 ps., fle. en
 Mayo.
 640. Amigdalus Communis/Almendo.
 641. Mespilus. [Otra etiqueta de otro ejemplar dice]: Mespilus/
 pseudo-cidonia [tachado]/ [=Pirus Amelan/chier].
 642. 20 de Abril/ Mespilus chamaemes-/pilus W./ me parece es-
 pecie nu/ eva foliis serratis acute/ como el Chamaemespilus/ y sub-
 tus tomentos como/ el Cotoneaster Riomolinos [Falta el ejemplar].

CLASE XIII

643. Chelidonium/ maius.
 644 Chelidonium maius W / Siles. 28 de Marzo.
 645. Chelidonium (Glaucium) pedunculis/ unifloris, foliis am-
 plexicaulibus/ sinuatis, caule glabro. Pract. Bot./ de Lin. pr. Palau
 tº. 4º. pª. 301./ Glaucium flore luteo. T. Inst./ R. H. 254. Flora Esp.
 tº. 5º. pª. 165./ Papaver corniculatum. Lag. in/ Diosc. 415. majus.
 Dodon. pem. 448./ Papaver flore luteo corniculat.m /Swert. florileg.
 lib. 2º. fol. 22./ Habita en los suelos mariti-/mos de España, y se
 cultiba en Cor-/doba, en el Jardin de la Alameda./ y pr. mi: es pe-
 renne fle. Abl. y Mo. [Reverso]: Observé esta especie en la playa/ del

Mediterraneo, en Cataluña/ junto, á Malgrat, en Sbre de 1795./ y de ayi trage semilla á Cordoba.

646. *Papaver* (Hybridum) capsulis subglobosis torosis hispidis, caule folioso multifloro. P. B. de L. pr. Palau tº. 4º. 304./ *Papaver erraticum*, capite oblongo, hispido. Tourn./ Inst. R. H. 238. no lo trae Quer F. E./ Esta especie se cria en los campos de labor de los/ alrededores de Cordoba en los mismos sitios que la/ *Hamapola* vulgar: es yerba anual y florece en/ los meses de Marzo y Abril.

647. *Papaver hybridum*.

648. *Papaver* (Rhoeas) capsulis glabris globosis, caule piloso multifloro, foliis pinnatifidis incisis. Pract. Bot. de Lin. pr./ Palau tom. 4º. pag. 306. / *Papaver erraticum*, majus Dioscoridis, Plinii./ Theophrasti. T. Inst. R. H. 238. Flora Española tº. 6º. 54./ *Papaver erraticum*. Lag. C. B. com. Mat. 745./ Se cria en abundancia asombrosa en todos los/ campos de labor del circuito de Cordoba, la llaman *A-mapola*, es annua y florece en Marzo y Abril.

649. Class. Decima-tercia Polian-/dria Ordo Monoginia/ *Papaver cristatum* o *papa-/paberis somniferi*/ Linn. pr. Pal. tom. 4º. pº. / 308 / Se cultiva en Cordova en/ casi todos los jardines bajo el/ nombre de *Amapolas* de Yndias,/ este esqueleto no es de los mas/ dobles aun quando su semilla/ lo era, pr. algunas circunstan-/cias que acompañaron el tpo. / de su sembradura, otras son/ como el buelo de los Claveles [Reverso]. mas grandes a esta benefi-/ca planta vemos la salutife-/ra medicina del opio, tan acre-/ditada de algun tpo a esta par-/te y no sin mucha razon, es el/ tonico difusibo mas poderoso/ que se conoce, pero aun es mas/ calmante y anodino, y pudiera/ llamarse con razon el reme-/dio unibersal, y el manjar de/ los Dioses, hablando con el/ language de los Poetas, en el es/tado de opio puro es mas narcoti-/ca que calmante, pero en el de ex-/tracto aquoso segun los ultimos/metodos, es el anodino mas se-/guero, y posee las propiedades di-/chas arriba en el mas alto grado.

650. *Papaver / corniculatum*.

651. *Nymphaea* (Lutea) foliis carda-/tis integerrimis, calyce petalis/ majore pentaphyllo. Pract. Bot./ de Lin. pr. Palau tº. 4º. pag. 316./ *Nymphaea lutea*, major./ T. Inst. R. H. 261. F. Esp. tº. 5º. 497./ *Nymphaea lutea*. C. Bauhin./ com. Mat. sup. Diosc. 643. Dodon./ pemp. 585 / Vi esta planta en un pilon/ de agua en el Jardin Botani-/co de Sevilla, donde cogi este esqto.

652. *Tilia* (Europaea) floribus nectario/ destitutis. P. B. de L. pr.

P. tº. 4º. pª. 329./ *Tilia foemina*, folio majore. T./ Inst. R. H. 611 Flo. Esp. tº. 6º. pª. 388./ *Tilia*. Lag. in Diosc. 78. foemi-/na. C. B. com. Mat. sup. Diosc. 156./ vulgo: Tila / Este Arbol que es de la corpulencia de un Alamo, se cria en España/ en Aragon, Asturias, y los pirineos de/ Jaca, se cultiba un gran Arbol en Cor-/doba en el Ospital de Jesus, de donde se/ han sacado varias plantas. florece en Mayo, y Junio.

653. *Tilia microphylla* / Decandolle.
654. *Tilia Platyphyllos* / Decandolle.
655. *Cistus laurifolia* / W.
656. *Cistus Laurifolia* W./ Ledon?
657. *Cistus Ladaniferus*. W.
658. *Cistus Monspeliensis* / Cabrera.
659. *Cistus Salvifolius* W.
660. *Cistus* / *albidus* / W.
661. *Cistus Albidus*.
662. *Cistus Crispum*. L.
663. *Cystus crispus* L.
664. 38 *Cistus crispus*/ H.
665. *Cistus Halimifolius*. L./ *sericeus*. W.
666. *Cistus Libanotis*. L.
667. 34 Lag / *Cystus Libanotis*. fol nob. [tachado rosmar].
668. *Cistus Rosmarinifolios* / *Libanotis* L.
669. *Cistus libanotis*/W.
670. *Cistus* / *umbellatus* / W./ *ipse est* / *libanotis*.
671. *Cistus umbelatus* W./ Arroyo de D. Lucas
672. *Cistus* / *calicinus*/ W.
673. *Cistus* / *calycinus*.
674. *Cistus Levipes*. / *fumana* / W.
675. *Cistus canus* W.
676. *Cistus Italicus* / Cabrera.
677. *Cistus* / *Marifolius*.
678. *Cistus guttatus*.
679. *Cistus Guttatus* W./ tambien encuentro yo xaras, / sin herborizar en las Sierras de / Segura. / Es el *Cistus punctatus* W.
680. *Cistus* / *Ledifolius* / Abril de 1808.
681. n.º 39. H. / *Cystus salicifol*. L.
682. *Cistus Ledon*. W.
683. *Cistus Salicifolius* / W.

684. *Cystus Niloticus* L.
685. *Cistus aegyptiacus* W / Lagar del rosal 10 de Abril.
686. *Cistus aegyptiacus*
687. *Cistus aegyptiacus*/W.
688. *Cistus squamatus*. / [Otra etiqueta dice]: Determinada por Dn / Pedro Abatt catedra / tico de Botanica en / Sevilla./ Yo la tengo por variedad del / *C. Racemosus*.
689. *Cystus...* Surreianus. / n.º 33 Lag. ca. / Esta especie se distingue de / las demas herbaceas con estipulas/ pr. las hojas florales sentadas y/ sin estipulas, y pr. las flores en/ espiga ladeada y rebuelta: tiene/ los calyces mas agudos qe. las de-/mas especies, y diez estambres.
690. *Cistus numularius* / W.
691. 30/*Cistus serpilifolius* / W.
692. *Cistus thimifolius* / W./ An sp. nova / quae vercilatus dici/ poterit / nam stipulae in folia abeunt.
693. *Cistus Thymifolius*.
694. *Cistus Thimifolius* / Cabrera. [Otra etiqueta dice]: *Cistus thym* / Fumana viscida Spach/ 10 M/ Vsgr - 2 Julio.
695. *Cistus pilosus* / v. β W./ 38.
696. *Cistus strictus* [tachado strictus]/ W./ pilosus v. β .
697. *Cistus racemosus* / H. / Segura.
698. *Cistus Racemosus*/. Cabrera.
699. 33 / *Cistus racemosus*.
700. *Cistus polifolius* / W./ hirtus. [tachado polifolius].
701. *Cistus Populifolius* L.
702. 11 *Cistus* H.
703. Xara como romero.
704. *Cistus croceus*/ W.
705. *Cistus dichotomus* ? / W.
706. *Cistus ellipticus* / W./ polianthos.
707. *Cistus elipticus* /W./ 29.
708. *Cistus lavandulaefolius*/ W.
709. *Cistus mutabilis* / Caban. /33/ H./ 38/ C.
710. *Cistus/plantagine-us*/ W.
711. *Cistus/ plantagineus*/W.
712. *Cistus punctatus*/W.
713. *Cistus serratus*. W./ aunque no tiene los Petalos/ aserrados creo es mas bien esta/ especie que el *C. Guttatus*/ pero de las dos no' escapa.

714. *Corchorus* (olitorius) capsulis ob-/longis ventricosus, foliorum serra-/ turis infimis setaceis. Pract. Bot / de Lin. pr. Palau tº. 4º. pag. 369./ *Corchorus* sive *Melochia*. T / I. R. H. 259. / Esta planta habita en Asia, / Africa y America. Pal. la vi culti-/bada en el Jardin Botanico de Se-/villa año de 1793. donde cogi este / esqueleto: es annua y florece en/ el Estio.

715. Polyandria. Diginia / G. / *Poeonia* / Llamada asi porque *Poeon* medico antiguo/ la descubrio ó puso en uso./ *Poeonia* (Officinalis) foliolis oblogis. mascula. / Pract. Bot. de Lin. pr. Palau tom. 4º. pag. 382./ *Poeonia* folio nigricante, splendido, quae mas. T./ Inst. R. H. 273. Flora Española tº. 6º pag. 42./ *Poeonia* mas. Dod. pempt 194. C. B. com. Mat. 655. / La Peonia se cria en la sierra de Cordoba, y donde se/ halla en grandisima abundancia es en las Gamonosas/ dehesas situadas hacia Villa-viciosa: su raiz es perenne,/ florece en Abril y Mayo.

716. *Delphinium* consolida/ú otra especie.

717. Class. Decima - tertia Poliand^a./Ordo Triginia/*Delphinium* Ajacis/Linneó por Palau tº. 4º. p.^a 390/ *Delphinio* de *Ajax*/ vulgo Espuela de Caballero/ Se cultiva en casi /todos los jardines de /Cordoba, y varia ma-/ravillosamte. en los colo-/res de la corola y doblan-/do su flor, qe. se hace ri-/zada y plena.

718. *Delphinium*/ *ajacis*/W.

719. *Delphinium* *Peregrinum* Lin.

720. *Delphinium* *peregrinum*/ ó/ D. *Ajax*/ Entrena.

721. *Delphinium*/ *Staphisagria*.

722. *Delphinium* (*Staphisagria*) *necta*-/riis *tetraphyllis* petalo brevioribus / foliis palmatis, lobis obtusis. Pract./ Bot. de Lin. pr. Palau tº. 4º. p.^a 394 / *Delphinium* *Platanifolio*, *Sta*-/*phisagria* dictum. T. I. R. H. 428./ Flora Española tom. 5º. pag. 44 / *Staphisagria*. C. B. com. Mat / sup. Diosc. 850. Lag. 471. Dod. p. 366./ vulgo: Albarraz./ Se cria esta especie en el/termino de Cordoba, particularmte. /en las dehesas de Rivera, se hace/ gran cosecha de sus semilla, que sir-/ [Reverso]: ve para matar los piojos con su/cocimiento. Es annua y florece/ por los meses de Mayo y Junio.

723. *Delphinium*/ V. 14 Julio.

724. Classis Decima-tercia Poliandria Ordo/ *Pentaginia*/ *Aquilegia vulgaris*/Linneo pr. Palau tº. 4º./ pag.^a 405= *Aquilegia*/vulgar, (vulgo) *Aguile*-/*ña*, Manto real, *Peli*-/*canos*./ Se cultiva en Cordo-/va en casi todos los /Jardines y entre ellos/ en el de la Condesa/ de la Torre de donde/ obtube este esqueleto.

725. *Aquilegia* (vulgaris) nectariis incurvis. Pract. Bot. de/ Lin. pr. Palau tº. 4º. pag. 405. / *Aquilegia* sylvestris. T. Inst. R. H. 428. Quer / Flora Española tº. 3º. pag. 81. / *Aquilegia*. Dod. pempt. 181. *Aquilina*. C / Bauhin. comment. Matth sup. Diosc. 467. / Esta planta se cultiva en Cordoba, la llaman/ *Pelicanos*, varia produciendo las flores dobles, y de color blanco, florece en Abril y Mayo.

726. *Nigella*/ *Arvensis* /Cabrera.

727. *Nigella* *Orientalis*.

728. *Nigella* *Vulgaris*/ vulgo Arañas.

729. *Anemone* *Coronaria*.

730. *Anemone* (*coronaria*) Variet. *α* ./Pract. Bot. de Lin. pr. P. tº. 4º. 434. / *Anemone* *tenuifolia*, mul-/tiplex, rubra. C. B. P. 176. / *Anemone* *tenuifolia* ple-/no flore, ex atro purpuracen-/ti. Swert. florileg. lib. 1º. fol 4 / Esta hermosísima *Anemone*/ se cultiva en todos los Jardines/ de Cordoba, y en muchísimas ca-/sas, Su raíz es pe. fle. en Mzo y Al.

731. *Anemone* (*Palmata*) foliis cordatis/ sublobatis, calyce hexaphylo colorato / Lin. Spec. Plant. pr. pu. tº 4º. pª. 435. / *Anemone* *Cyclaminis* seu *Malvae*/ folio, lutea. C. B. P. 173. T. I. R. Herv. / 275. F. E. tº. 3º. pª. 34. / *Anemone* *hortensis* lutea Swert. / Florileg lib. 1º. fol. 3. / Esta planta se cria con abundancia á/una Legua de distancia de la Ciudad de Cordoba/ en Sierra-morena, en territorio del Lagar de/ torre-doria, y en todos aquellos contornos, donde/ la he observado, y de donde la traje á Cordoba el/ Año de 1792. Su raíz es perenne, tuberosa, de/ donde salen las hojas con pezones mui largos, ha-/ llandose estas pegadas al suelo alrededor de la plan-/ta pr. estar aquellos soterrados. Florece en Abril.

732. *Anemone*

733. *Clematis* (*Vitalba*) foliis pinnatis foliolis cordatis/ scandentibus. Pract. Bot. de Lin. pr. Palau tº. 4º. 449. / *Clematitidis* sylvestris latifolia. T. I. R. H. 293. / Quer Flora Española tº. 4º. pag. 351. / *Clematis*. tertía. C. B. com. Matth. pag. 680. / *Clematis* altera. Lag. in Diosc. 380. / *Vitalba*. Dodon. pemp. 404. / Se cria en Cordoba en el arroyo Pedroches y otros/ su raíz es perenne, brota en Mzo. y fe. Junio y Jo.

734 Class. decima-tercia Poliandria/ Ordo Poliginia/ *Clematis* *vitalva*/ Linneo pr. P. tº. 4º. p. 449/ *Clematide* *vidalva* (vulgo) /Yerva de los Pordioseros. este/nombre lo deve a ser una/planta muy acre corrosiba/ razon pr. qe. los Pordioseros fin-/gidos se la aplicaban a

el cu /erpo, y se formaban llagas:/ se cria con mucha abundancia en la sierra de Cordova / donde vulgarmte. la llaman/ yerba Molinera== flore-/ce pr. Junio, y Julio.

735. Clematis Flamula Lin.

736. Talictrum Flavum. L.

737. Adonis/ autumnalis.

738. Umbria Abril. 1812./ 48. L /Adonis vernalis.

739 Polyandria Polygynia / G/ Ranunculus./ *Ranunculus* (bullatus) =/foliis ovatis serratis, scapo nudo/ unifloro. Lin. Spec. Plantarum/ pr. pu. tº. 4º. pª. 471./ *Ranunculus Lusitanicus*, folio sub-/rotundo, parvo flore. Tourn. Inst/ Rei Herbar. 286./ Flora Española tº. 6º. pª. 171./*Ranunculus Lusitanicus*. Dod./pempt. 420./*Ranunculus latifolius*, bullatus,/Asphodeli radice C. B. P. 181./Se cria con mucha abundancia en/ los con tornos de Cordoba, como es en las / canteras, en las inmediaciones de la /Arrizafa &tc. florece por Octubre y / Noviembre: su raiz es perenne: pr. cri-/arse en la Arrizafa y florecer en Noviembre/ la llaman vulgarmente flores de San Diego.

740. *Ranunculus* (Repens) &c. Pract. /Bot de Lin. pr. Palau tº. 4º. pª. 483./ Variatus floribus plenis.=/vulgo: Boton de Oro. /Esta planta se cultiba en /Cordoba, en Jardines y casas/ particulares; se propaga y cunde /mucho con sus sarmientos: es pe/renne y florece en Marzo y/ Abril.

741. *Ranunculus* (Ficaria) foliis cordatis angulatis petio-/latis, caule unifloro. Pract. Bot. de Lin. pr. Pal. tº. 4º. 471./ *Ranunculus vernus*, rotundifolius, minor. Tournef / Inst. R. H. 286. Quer Flora Española tº. 6º. pag. 166./ *Chelidonium minus*. Lag. in Diosc. 257. Casp. B./ commnt. Matth. pag. 468./ Esta planta se cria en sitios humedos de los campos de /Cordoba, como el Arroyo Pedroches. en el Bosque de la A-/lameda, en las Acequias de las Hnertas. &tc. 2. fe. en Mzo.

742. *Ranunculus Asiaticus*.

743. *Ranunculus* (Asiaticus) Vs. ♀ / Pract. Bot. de Lin. pr. P. tº. 4º. 478./ Se cultiba en Cordoba en/los Jardines y casas particula-/res: su raiz es pe. fe. en Mzo.

744. *Ranunculus bulbosus*.

745. *Ranunculo* /acre.

746. *Ranunculus Aquatilis*.

747. *Helleborus fetidus* [tachado fetidus] niger /W.

CLASE XIV

Clasis / XIV / Didynamia. / Ordo / Gimnos-/ per / mia.

748. *Aiuga pyramidalis*. / cultivada en casa / 1814.

749. *Ajuga* (reptans) stolonibus reptantibus Pract. Bo-/ tanic. de Lin. pr. Palau tº. 4º. pag. 525. / *Bugula*. Dod. pempt. 135. T. Inst. R. H. 209. / Flora Española tº. 3º. pag. 317. / Se cria en varias partes de España vease Qr. / la cultibo en Cordoba, y el año de 1794 invié / un cespel de ella á Sevilla; se propaga mucho / rastreando, es perenne y florece en Abril y Mº.

750. *Teucrium* / *Chamepitis*.

751. *Teucrium camae-pyt* L.

752. *Teucrium* / pseudo-chamepitis / W.

753. *Teucrium* Pseudo-Cha-/mepytis.

754. *Teucrium Iva* L. / Cabrera.

755. *Teucrium fruticans*. / Vulgo-Olivilla.

756. *Teucrium* (Marum) foliis integerri-/mis ovatis acutis petio-
latis subtus to-/mentosus, floribus racemosis secundis. / Pract. Bot. de Lin. pr. Palau tº. 4º. 534 / *Chamaedris* incana maritima fru-/tecens, foliis lanceolatis. T. I. R. H. / 205. Flora Española tº. 4º. pag. 167. / *Marum*. Lag. 296. C. B comm. / Mat. in Diosc. 536. / Farm. Marum Cortusi, et verum. / Se cria en el Reyno de Valencia, / y se ha cultibado en Cordoba en Jesus/Nazareno, y se cultiba hoy por mi. / En el Año de 1790. remití un / gran Zesped de esta planta al Jardin/Botanico de Sevilla, donde la vi en / el de 93. Es perenne-/y florece en los Meses de Junio y Julio. / El olor de esta planta es suma-/mente agradable á los Gatos, los incita / á Luxuria, por lo que se deleitan en mor-/derla, y revolcarse sobre ella, derraman-/do muchas babas, y alguna vez su es-/perma, quedando despues como aturridos / ó enagenados. Por este motivo, para con-/servarla, no se puede tener en el suelo, / ni en parte donde ellos la alcancen.

757. *Teucrium Scorodonia*.

758. *Teucrium* / *Scordium* / Cabrera.

759. *Theucrium* / *camedrios*.

760. Class. XIV Didinamia Ord. Gimnospermia / *Theucrium Chamaedris* / Linn. Tom. 4º. Pagª. 543 / *Teucro Camedris*.

761. *Theucrium* / *pirenaicum* / W. [tachado *An rotundifolius* ?]

762. Class. XIV Didinamia Ord. Gimnospermia / *Theucium Polium*/ Linn. Tom. 4º. pagª. 547/*Teucro Polio* (vulgo) Zamarilla. [Otra etiqueta dice]: Dudo qe sea *teucium*/ pero no hai corola.

763. *Teucium* (*Polium*) capitulis subrotundis, foliis oblongis/ obtusis crenatis tomentosiss sessilibus, caule postrato. Pract. / Bot. de Lin. pr. Palau. tº. 4º. pag 547. [Otra etiqueta dice]: *Teucium* (*Polium*) Vs. β. Pract. Bot. de Lin. pr. / Palau tº. 4º. pag. 547 / *Polium montanum album*. T. Inst. R. H. 206./ Quer Flora Española tº. 6º. pag. 114./ Se cria con mucha abundancia en Cordoba/ en terrenos incultos y margenes de los caminos de la / sierra y en toda la falda de ella: es perenne y flo-/rece en los meses de Mº. y Jº

764. *Teucium Polium* L/ Entrena.

765. *Teucium*/ *polium* Lin./ seu *capitatum*/ W

766. *Teucium Gnafalodes*. W.

767. *Teucium valentinum*.

768. *Theucium*/ *rorismarinifolio*?/ 41. H. / V. 8 Julio

769. *Teucium*/ son dos variedades? / *rotundifolium*/ 45. L./ C. istmo 21 de Julio.

770. *Rara*./ *Satureia Greca* L.

771. *Satureia* (*Hortensis*) pedunculis bifloris / Lin. Sp. Plant. pr. pu. tº. 4º. pª.555./ *Satureja sativa*. Tourn. p. 197 Flora Española tº. 6º. pª. 253./ *Satureja*. Dod. pempt 289./ *Satureja*. Lag. in Diosc. 294./ vulgo Axedrea./ Dice Quer en su Flora española que se/ cria naturalmente en algunos terrenos de/ España; pero no los señala, se cultiva en las/ huertas y Jardines, y en Cordoba en muchas/ partes. Es annua y florece por Junio y/ Julio.

772. *Satureia* (*Capitata*) floribus spicatis, foliis cari-/natis punctatis ciliatis. Pract Bot. de Lin. pr. Palau/ tº. 4º. pag. 555. *Thymus capitatus*, qui *Dioscoridis*. T. Inst. R./ Herv. 196. Quer Flora Española tº. 6º. pag. 384./ *Thymus*. Lag. 292.= *Thymum*. C. B. comment./ Matth. sup, Diosc. 531.=vulgo: *Tomillo legitimo*. / Esta planta se cria con mucha abundancia/ en los terrenos aridos de los campos de Cordoba, es/ perenne y florece en los meses de Junio y Julio.

773. *Satureia*/ *Linifolia Cabrera*/ Desfontaines.

774. *Timbra spicata*.

775. *Thymbra verticillata*/ W.

776. *Hyssopus* (*Officinalis*) spicis se-/cundis, foliis lanceolatis.

Pract./ Bot. de Lin. pr. Palau tº. 4º. 558./ *Hyssopus officinarum*, coerulea seu spicata. T. Inst. R. H. / 200. Flora Española tº. 5º. pag. 247. *Hyssopus vulgaris* Dod. pem-/ pt. 287./ Esta planta se cria en varias partes de España: Quer, y se cultiba/ en Cordoba por algunos curiosos./ Es perenne y florece en Ma-/yo y Junio. Su semilla la hice ve-/nir á Cordoba del Jn. Bº. de Sevilla.

777. Class XIV Didinamia Ord. Gimnospermia/*Nepeta Cataria*/ Linn. Tom 4º. pag.^a 561/ *Nepeta Cataria*.

778. *Nepeta*/ *Cattaria*/ Cabrera.

779. *Nepeta violacea* L. / Entrena. [Otra etiqueta dice]: *Nepeta*/ V. 3 de Julio.

780. *Nepeta Violacea*.

781. *Nepeta Nepetela* L / Entrena.

782. *Nepeta tuberosa*/ *Statice limonum*.

783. *Nepeta* (Tuberosa) spicis sessili-/bus terminalibus, bracteis ova-/tis coloratis, foliis summis sessi-/libus. Pract. B. de L. pr. P. tº. 4º. 564./ *Cataria Hispanica*, supina/ *Betonice folio*, tuberosa radice / T. J. R. H. 202. F. E. tº. 4º. p.^a 33./ Se cria esta especie de plan-/ta tres leguas de Cordoba entre/ campo alto y campo baxo, cami-/no de los Pedroches, y la he visto/ hacia las cuebas de la Albayda./ Su raiz es perenne: florece en Mayo.

784. *Lavandula* (Spica) foliis lan-/ceolatis integerrimis, spicis nudis./ Pract. B. de L. pr. Palau tº. 4º. 571./ *Lavandula angustifolia*. T. I./ R. H. 198. F. E. tom. 5º. p.^a 315 / Dodon. pempt. 273./ *Lavendula*. C. B. comm. Mat./ sup. Diosc pag. 32./ vulgo *Alhucema*./ Se cria en Andalucia: se/ hace mucho uso de la flor para/ perfumar, la planta se culti-/ba en Cordoba para dibuxos en/ los Jardines. Es pe. fle. en Junio.

785. *Lavandula spica*/ W.

786. Class. XIV Didinamia Ord. Gimnospera / *Lavandula Dentata*/ [tachado spicata] Linn. tom. 4º. pag.^a 572./ *Lavandula Dentata*.

787. *Lavandula* (Dentata) foliis pinna-/to-dentatis, spicis ramosis. Pract./ Bot. de Lin. pr. Pal. tº. 4º. pag 572 / *Lavandula foliis crenatis*. T./ Inst. R. H. 198. Fl. Esp. tº. 5º. p.^a 316./ Esta especie dice Quer la ha/ visto en el contorno de Cordoba;/ mas yo no la he visto todavia./ Se cultibaba en el Jardín Bo-/tanico de Sevilla el año de 1793./ donde cogi este esqueleto: es pe-/renne y florece en el Estio.

788. *Lavandula* (Stoechas) foliis lanceo-/lato-linearibus integerrimis, spi-/cis comosis. P. B. de L. pr. P. tº. 4º. 572./ *Stoechas* purpurea. T. I. R. H./ 201. Flora Española tº. 6º. pª. 335./ *Stoechas*. Lag 284. C. B. com./ Mat. sup. Diosc. 518./ vulgo *Cantueso*./ Esta planta se cria con mu-/chisima abundancia en las cer-/canias de Cordoba en terrenos/ aridos y guijarrosos, como en la/ peña de la buena vista, en el/ arroyo de las peñas, y en toda la/ Sierra. Es perenne y florece/ en los meses de Abril y Mayo.

789. *Sideritis* (montana) herbacea ebracteata/ *calicibus corola* [tachado brevioribus] *maioribus* spinosis/ labio superiore trifido. Palau. t. 4 p. 576./ La cogi en Nabalasna cortijada de Segura/ y la traxe viva á Cordoba año de 1814.

790. *Sideritis* Romana/ Mayo 24/ Cavan. f. 323.

791. No se pueden observar/ los estambres revueltos/ *Stachis* recta Cav/ó/ *Sideritis* romana Cav/ Entrena.

792. *Sideritis* romana. 22. L.

794. *Sideritis* / incana/ W. [Otra etiqueta dice]: Collado arenoso —10 Julio.

795. *Sideritis*/ blanquecina.

796. *Sideritis* scordioides/ W./ Desde la Venta de Ezpelui/ en el sitio de las Canteras/ viniendo á Andujar.

797. *Sideritis*/ *Scordioides*/ W.

798. *Sideritis*/ de pelo aspero.

799. *Sideritis* /hirsuta.

800. *Mentha* (Sylvestris) spicis oblon-/gis, foliis oblongis tomentosis ser-/ratis sessilibus, staminibus co-/rolla longioribus. Pract. Botan. de/ Lin. pr Palau tom. 4º. pag. 583./ *Mentha sylvestris* folio longi-/ore. T. I R. H. 189. Flª. Espª. tº. 5º. 429./ *Menthastrum*. C. B. comment./ Matthiol. sup. Diosc. 527. Lag 291./ Se cria esta especie en varias/ partes de España: vease á Quer./ Me dio este esqueleto con aquel/ nombre Generico y Especifico, Dn./ Anastasio Guzman en Sevilla/ año de 1793. *Mentha Rotundifolia* L/ Entrena. [Otra etiqueta dice]:

801. *Mentha* Menthastr-/rum. [Otra etiqueta dice]: *Mentha Rotundifolia* L/ Entrena.

802. *Mentha* Hirsuta L./ M ¿Aquatica? / Entrena.

803. *Mentha*/ Aquatica/ Cabrera.

804. *Menta* Rotundifolia L/ Entrena. [Otra etiqueta dice]: Class.

XIV Didinamia Ord. Gimnosp^a / *Mentha Aquatica*/ Linn. Tom. 4^o. pag.^a 586 / *Menta Aquatica*.

805. Class. XIV Didinamia Ord. Gimnosperm^a/ *Mentha Sativa*/ Linn. Ton. 4^o. Pag^a. 587./ *Menta Sativa* (vulgo) Yerva buena.

806. *Mentha* (Gentilis) floribus ver-/ticillatis, foliis ovatis acutis ser-/ratis, staminibus corolla brevio-/ribus. Pract. B. de L. pr. P. t^o. 4^o. 588./ *Mentha hortensis*, verticil-/lata, Ocymi odore. T. Inst. R. H./ 189. Flora Española t^o. 5^o. pag. 486./ *Sandalos* llaman en Cor-/doba á esta planta que se culti-/ba en muchisimas partes de la / Ciudad: la raiz tiene perenne/ y cundidora: florece en Junio/ y Julio y parte de Agosto.

807. Class. XIV Didinamia Ord Gimnosperm^a / *Mentha Gentilis*/ Linn. Tom. 4^o. pagina 588/ *Menta Gentil* (vulgo) Sandalos.

808. *Mentha pulegium* / Lin. Spec. plant. 807 / clase 14. orden gimnosperm / *Mentha aquatica*, seu Pu-/legiun vulgare. T. 189.

809. *Mentha Pulegium*/ vulgo Poleo/ Cabrera.

810. Class. Decima-quarta Didinamia/ Ordo Gimnospermia/ Glecoma Hederacea/ Linn. pr. Palau tom. 4^o. p^a/ 594 Glecoma como Yedra (vulgo) / Yedra terrestre: es sola en su es-/pecie hasta aora, ó pr. lo menos/ pr. Linneo y Cabanilles, se culti-/ba en Cordova en varios jardi-/nes, y entre ellos en el de el Hos-/pital de Jesus, de donde trage/ este esqueleto.

811. *Lamium amplexicaule* L.

812. *Betonica officinalis*/W.

813. *Stachys germanica* Cav.

814. *Stachis* / de Palestina?

815. *Stachys recta*, Mayo/, 22.

816. *Stachys recta* 23. C.

817. *Stachys recta*/Entrena.

818. *Stachys recta*.

819. Balota negra.

820. *Marrubium*/ candidissimum/W. /Siles-Junio-29-

821. *Marrubium hispanicum*. L.

822. *Leonurus*/n.º 41 C. [Otra etiqueta dice]: *Leonurus*. Marru-/bias/trum? /Entrena.

823. *Phlomis Fruticosa* Cavs. /Entrena. [Otra etiqueta dice]:

Class. XIV Didinamia Ord. Gimnospermia/Phlomis Lichnites /Linn. Tom. 4º. pagª. 634/ Phlomis Lichnitide (vulgo) Candilera.

824. Phlomis Purpurea.

825. Phlomis Licnithis-Mayo 22.

826. *Phlomis* (Lychnites) foliis lanceo-/latis tomentosis, floralibus ovatis,/ involucris setaceis lanatis. Pract./Bot. de Lin. pr. Palau tº. 4º. pª. 634./ *Phlomis* Lychnitis. T. I. R. H./ 178. Flora Esp. tº. 6º. pag. 95./ Esta planta se cria en Cor-/doba en terrenos aridos y gijar-/rosos, como en toda aquella par-/te del camino de los Pedroches pa-/sada la puente. Es pe. y fe en Mayo.

827. *Phlomis* Nisolia?/ [Otra etiqueta dice]: No es el Plomis Nisolia, /ni ninguna especie de/ las qe. describe Lineo, Acaso/W. la trahera. como no/ esta fresca no se puede decidir/ sera el *Marubium Peregrinum*.

828. *Phlomis* herbaventi. Cavs.

829. *Phlomis* herba-venti L./ no se cria muy cerca de Cordo/ba aunque ignoro el paraje.

830. nº. 426/ *Mollucela* Spinosa Cav.

831. *Origanum* (Dictamnus) foliis inferiori-/bus tomentosis, spicis nutantibus. Lin./ Spec. Plant. pr. pu. tº. 4º. pª. 647 /*Dictamnus* Creticus. C. B. P. 222./ *Dictamnus* verum. Dod. pemp. 280./ *Origanum* Creticum, latifolium, to-/mentosum, seu *Dictamnus* Creticus. T./I. R. H. 199./*Dictamnus*. Lag. in Diosc. 288./ Farmac: *Dictamnus*, vel *Dictamnus* Cret / Havita en el Mote Ida de Creta. L / Esta planta apreciable pr. ser exotica/ se cultiva en Cordoba por algunos Curiosos,/ donde vejeta con la mayor lozania: sazona/ sus semillas, y nace de ellas; yo la he cultiva-/do, y el Año de 1792 invie una maceta della/ al Jardín Botánico de Sevilla, donde la vi / con conplacencia el de 93. Es perenne y florece en el Estio.

832. *Origanum* (Vulgare) spicis subro-/tundis paniculatis conglomeratis,/bracteis calyce longioribus ovatis./ Pract. Bot. de L. pr. P. tº. 4º. pª. 649./ *Origanum* sylvestre, Cunilla/ bubula Plinii. T. I. R. H. 198 / Flora Española tº. 6º. pª. 26./ *Origanum* sylvestre. Lag. 286./ Dodon. pempt. 285./ *Origanum* Vulgare. C. B. in/ comment. Mat. sup. Diosc. 519./Se cria en toda la Sierra-mo-/rena de Cordoba. Se hace mucho / uso de el en las viandas; es pe-/renne y florece en el Verano.

833. *Origanum Mayorana*/ vulgo - Mejoranas.

834. Class. XIV Didinamia Ord. Gimnospermia/ *Origanum Mayorana*/Linn. Tom. IV pag^a. 652/ *Oregano Mejorana* ó *Almoradux*



Figura 4^a—Portada del Herbario de los botánicos cordobeses Rafael de León y Gálvez, Fr. José de Jesús Muñoz Capilla, Rafael Entrenas y Antonio Cabrera. Se conserva en el Museo de Biología de la Facultad de Veterinaria de Córdoba.

835. *Thymus vulgaris*/varietas γ W.

836. *Thymus Zygis*. Cav.

837. *Thymus* (*Zygis*) floribus verticillato-/spicatis, caule suffruticoso erecto, foli-/is linearibus basi ciliatis. Pract. Bot./ de Lin. pr. Palau tom. 4^o. pag. 655./ *Thymbra Hispanica*, Coridis fo-/lio. T. I. R. H. 197. F. E. t^o. 6^o. p^a. 377./ Esta planta se cria con mucha/ abun-

dancia en las cercanías de Cor-/doba, como el Marrubial, y parti-/cularmente en los cerros que vierten/ al Arroyo Pedroches, es perenne, y / florece por Abril y Mayo.

838. Vease el caracter diferencial/ de la Satureia qe la separa/ del thymus. en Lin tourn./ *Thymus Cephalotus* L./ Entrena/ vide viride.

839. Class. XIV Didinam. Ord. Gimnosper^a./ *Thimus Cephalotus* [tachado: *Capitatum*] /Linn Tom. 4º. pag^a. 657 /Tomillo de cabezuela.

840. ¿An *thymus Villosus* L.?/ Entrena. [Otra etiqueta dice]: *Thimus/Capitatus/Cabrera*.

841. Class. XIV Didinamia ord. Gimnosper^a./ *Melissa Oficinalis*/ Linn. Tom. 4º pag.^a 660/*Melisa officinal* V. Toronjil.

842. *Melisa officinalis*. Lin.

843. *Melissa/Calaminta/Cabrera*.

844. *Calaminta Montana* /Rodr. /*Melissa calamintha*. L. /C in R H M.

845. Class, XIV Didinamia Ord. Gimnospermia/ *Chalaminta Montana* Vel/ *Mellisa Chalaminta*/ Lin. Tom. 4º. pag^a. 661 *Melissa calaminta/ Mellisa pedunculis axilaribus/ dichotomis longitudine foliorum* Mat. Me-/dic 176=*Melissa foliis subhirsutis ova-/to-lanceolatis acute serratis petiolis/floriocris comosis folia superantibus* Hall. /Cavs. nº. 241.

846. Class XIV Didinamia Ordo /Gimnospermia/ *Occimun Basilicum* Linn Tom. 4º. pag^a. 678/ *Albahaca Real*

847. *Prunela Laciniata* /Entrena.

848. *Prunela Laciniata*/ Lin./ *Puente-hondo* - Junio-29.

849. *Cleonia Lusitanica*/Cabrera.

850. *Rhinanthus* / *crista-galli*.

851. *Rhinanthus* (*Trixago*) *calycibus hir-/suto-tomentosis, foliis oppositis, obtuse/ serratis, caule simplicissimo*. Pract. Bot./ de Lin. pr. Palau tom. 4º. pag. 709./ *Pedicularis maritima, folio oblongo/ serrato* T.I.R.H. 172. F. E. tº. 6º. 69./ Esta planta se cria en si-/tios humedos; en Cordoba en el Arro-yo Pedroches, y en el Caño Bazan/ cerca de la Arrizafa. Es annua/ y florece por Mayo y Junio.

852. *Euphrasia* (*Officinalis*) *foliis ova-/tis lineatis argute dentatis*. Pract./ Bot de Lin. pr. Palau tº. 4º. pag. 712./ *Euphrasia Officinarum*. T.I./R.H. 174. Flora Españ. tº. 5º p^a. 92./ Esta plantica se

cria en/ Cordoba en los prados de las dege-/sas, y en qualquier suelo ó terreno/ de corteza, como en la Peña de/ la buena vista, y en Peña taxa-/da y la Campiñuela, y otros. / Es annua y florece en Abril y/ Mayo.

853. *Euphrasia officinalis* L.

854. *Eufrasia linifolia* se cria junto/ á Siles de Segura y desde el Bonillo/ á Villarodrigo llamase vulgarmte./ Algarabia. 40. C./ 42. H.

855. *Eufrasia viscosa* 37. L. / Se cria con abundancia junto á/ Siles de Segura camino de la fuente/ Salivas y por todo el cerro de la her-/mita de Sta. Quiteria

856. *Euphrasia Viscosa* L. [Otra etiqueta dice]: *Euphrasia Purpurea* W.

857. *Linaria pilosa* (Desfontaines)/ ó/ *Anthirrinum pilosum* Lin.

858. *Linaria spuria* / Cab. 804 / *Antirrin.* L / Viz. 3 Sb're.

859. *Anthirrinum Spurium* L.

860. *Anthirrinum/ Cirrosum.*

861. *Antirrinum Purpureum.*

862. *Anthirrinum / bipunctatum/* mui bonito/ hacia la Ventilla/ en las Orillas del/ Guadalimar y el Cortijo de Paulez.

863. *Antirrinum sparteum* L/ an? *A. Arvense* Vars. β L.

864. [tachado *Narcisus bulbocodium*] / *Linaria* n°. 39. L. / *Antirrhin. triste?* L. [Otra etiqueta dice]: *Linaria* 41. L./ Amo. 11 Jul.

865. [*Anthirrinum / Saxatile*].

866. *Anthirrinum / saxatile.*

867. *Antirrhinum / villosum* W. / *Linaria hyspanica* / de Tournefort.

868. *Antirrhinum / organifolium/* W.

869. *Antirrhinum.* [tachado *Organifolium*]. W.

870. *Antirrhinum / hirtum* W.

871. *Antirrhinum* (hirtum) foliis lanceolatis hirtis alter-/nis, floribus spicatis, foliolo calycino supremo maximo./ *Pract. Bot. de Lin. pr. Palau* t°. 4°. pag. 761./ *Linaria latifolia*, villosa, laciniis calycinis inae-/qualibus, flore majore pallido, striato, rictu aureo. / *Quer Flora Española* t°. 5°. pag. 356 / Esta planta la tengo por Variedad de la especie/ indicada, por no producir las ojas hirsutas: se usa pr./ la *Linaria* oficial, en Cordoba, se cria en los campos/ de labor de su circuito, es annua floe. en Abril.

872. Class. XIV Didinamia ord. Gimnospermia / Anthirrinum junceum/ Linn. Tom. 4º. pagª. 762 / Antirrino como Junco.

873. Tetrandia monoginia/ caliz 5 fido/ corola bilabiada/ labio superior en dos lacinias/ inferior en 3, mayores las de los lados/ De los estambres 2 mas cortos unidos/ todos 4 por las antheras/ estigma en cabezuela/ caxa redonda/ Antirrinum iunce-/um.

874. Anthirrinum iunceum.

875. Visto 1838/ 3º / Didinamia/ Anthirrinum/ iunceum.

876. Anthirrhinum Linifoli-/um - Mayo 23.

877. Anthirrinum / [tachado hirtum] W./ pedunculatum.

878. Antirrinum Majus/L.

879. Antirrinum maius/Umbria/ 16 de Junio de 1812. [Otra etiqueta dice]: Antirrinum / maius. de la / Sierra de Segura.

880. Antirrhinum Mayus.

881. Anthirrinum orontium.

882. Antirrhinum orontium / Entrena. [Otra etiqueta dice]: Class. XIV Didinamia Ordo/ Gimnospermia/ Anthirrini species / Linn. Tom. 4º. pagª. 743.

883. Antirrinum Belideifo/lium. L. Entrena.

884. Anthirrinum sp. no./ foliis radicalibus / pinnatis/caulinis linearibus/ bifidis. et simplicibus.

885. Anthirrinum / simplex / W. [tachado haclava]

886. Antirrinum N. sp./in maritimis. foliis/ carnosis. nº. 38 Lag./ Cabrera/ ? Sparteum L.

887. Antirrynum/ micranthum /W.

888. Antirrhinum / [tachado bipunctatum] marginatum W.

889. Anthirrinum/ Latifolium W.

890. Anthirrinum/aparinoides/W.

891. Anthirrinum/ Amethistinum/W.

892. Anthir. Amestistinum /W.

893. Linaria Latifolia. W.

894. Linaria 2/ 17/Cañada roman/ Abril 1812.

895. Linaria / 9 de Julio/ cambron.

896. Linaria/ 40 L/ 9 Julio.

897. Linaria 42 L.

898. Martinia annua L.

899. Class XIV Didinamia Ord Gimnosper,a. / Scrophularia Aquatica/ Linn. Tom 4º. pagª. 782 / Escrofularia Aquatica.

900. Scrofularia auriculata.

901. *Scrofularia/ Frutescens/Cabrera*. [Otra etiqueta dice]: *Scrofularia canina/ Entrena*.
902. *Scrofularia Canina L./ Entrena*.
903. *Scrophulariae Species*.
904. *Digitalis Purpurea L/Entrena*.
905. *Digitalis/obscura / W/Crujia usase para / labar las heridas y llagas á las bestias*.
906. *Digitalis*
907. *Erino africano ó triste*.
908. *Orobanche maior*.
909. *Orobanche ramosa L./ Entrena*. [Otra etiqueta dice]: *Orobanche species*.
910. *Ruellia Paniculata / Lin/ C in R H M*.
911. *Vitex (Agnus-castus) Varietas α. / Pract. B. de Lin. pr. Pailau tº. 4º. 898 / Vitex latiore folio. T.I.R./ H. 603. F. Española. tº. 6º. pª. 476./ Vitex. Lag. 88. C Bahuin./ comm. Mat. sup. Diosc. pª. 173./ Agnus Castus Officinarum./ Swert. florileg. lib. 2º. fol. 43./ Se cria este Arbusto en las / orillas y en Ysletas del Guadalqui-/vir en Cordoba y se cultiba tam-/bien pr. algunos curiosos. Crece á / la altura de un Hombre y flore-/ce en el Verano*.
912. *Class XIV Didinamia Ordo/ Angiospermia/ Vitex Agnus Castus / Linn. Tom. 4º. pagª. 898 / Vitex Agno Casto (vulgo) Sauzgatillo*.
913. *Acanthus Mollis L / Entrena*.
914. *Acanthus / mollis*.
915. [*Acanthus mollis*].

CLASE XV

916. *Rapistrum Rugosum. Cavans*.
917. *Miagrurn hispanicum/ vespere lugubri*.
918. *Myagrurn hispanicum/ Cuesta de las hermitas/ 14 de Mayo de 1817*.
919. *Miagrurn perfoliatum*.
920. *Myagrurn/ perfoliatum*.
921. *Rapistrum paniculatum*.
922. *Myagrurn panniculatum/ W./ Rapistrum panniculatum/ Cabanilles*.
923. *Sierra del agua/ Subularia/ alpina*. [tachado *Biscutela apu-*

la/ W.J./ Convento de Sn. Agustin/ Al Iltmo. Sor. Dn. Fr. José de/ Jesus Muñoz, Obispo electo de/ Salamanca en/ Cordova.

924. Lo mismo qe. la anterior/ A la entrada del 27 L / Encebrico á los Malojares para/ bajar á las fabricas 18 de Marzo/ Draba? ciliaris.

925. *Draba alpina*/ *Draba*.

926. *Draba verna* W./ *petalis bifidis stigmatibus sessilibus foliis oblongis, acuminatis subserratis subhirtis scapo nudo*/ fuente de la loba./ 30 Marzo.

927. *Draba*/ *cespitosa*/ *apestañosa*.

928. *Draba contorta*/ *Decandolle*.

929. *Lepidium petreum* W./ *foliis pinnatis: radicalibus ovato lanceolatis caulinis linearibus*. 29 Marzo.

930. *Tetradinamia Siliculosa*./ G./ *Lepidium*.

931. *Lepidium Latifolium*.

932. *Lepidium* / *sufruticosum*/ dos variedades?

933. *Thlaspi* (*arvense*) *siliculis orbiculatis, foliis oblongis dentatis glabris*. Pract. B./ de Lin. pr. Palau tom. 5º pag. 37 / *Thlaspi arvense*, *siliquis latis* / T. Inst. R. H. 212. F. Esp. tom. 6º. 371./ *Thlaspi latius*. Dod. pempt 712./ *Thlaspi* iij C. Bauhin. comment./ Matthiol. sup. Diosc. pag. 427./ Esta planta se cria en España, y en Cordoba se cultiva en el Jardin de/ la Alameda, y tambien yo la he cul-/tivatedo, y remitido semilla de ella al/ Jardin Botanico de Sevilla. Es annua/ y florece en Abril y Mayo.

934. *Thlaspi campestre*/ Caban.

935. *Thlaspi perfoliatum*/ W.

936. *Thlaspi* — *bursa pastoris* W./ *foliis radicalibus pinnatifidis*. Siles. 28 de Marzo.

937. *Thlaspi vursa* pasto-/ris.

938. *Thlaspi* de fruto con hastitas.

939. *Cochlearia* (*Officinalis*) *foliis radicalibus cordato-subrotundis, caulinis oblongis subsinuatis*. Pract. Bot. de Lin. pr. Palau tº. 5º. pag. 44 / *Cochlearia folio subrotundo* T. I. R. H. 215. F. Esp. tº. 4º. 372./ Casp. Bauhin. com. Math. sup. Diosc. 380.=*Cochlearia*. Dod. p. 594 / Esta planta se cultiva en Cordoba en varias partes; yo la / he cultivado muchos años; se cria en España en los montes Py-/reneos de Cataluña, en los de Jaca, y de Vizcaya. Quer./ es annua y algunas vezes se hace perenne, florece en los / meses de Marzo y Abril.

940. Class. Decima quinta. Tetra/ dinamia Ordo Siliculosa/ Cochlearia Officinalis/ Linn. pr. Pal. tom 5º. pagª. / 44. Cochlearia oficial/ Este esqueleto lo obtube/ del jardin del Padre Mro, qe/ la cultiva como tambien en/ el de Casa; se usa en la me-/dicina pª varias enfermedades pero/ donde especialmte. se desem-/buelben sus propiedades es en / el Alcohol llamado de su nom-/bre, pues qe. este es el anti-es-/ corbutico mas poderoso de los qe / [Reverso]: se componen de ella.

941. *Cochlearia* (Armoracia) foliis radicalibus lanceo-/latis crenatis, caulinis incisis. P. B. de L. pr. P. tº. 5º. 47./ *Cochlearia* folio cubitali. T. Inst. R. H 215 / Quer Flora Española tº. 4º. pag. 379./ *Raphanus magnus*. Dod. pempt. 678 / *Raphanus rusticanus* sive vulgaris. C. B./ comm. Matth. sup. Diosc. 350 / Se cria en varias ps. de España: vease á Qr./ se cultiva en Cordoba en mi Jardin y otras ps. remi-/ti en 1794 una planta viva al Botanico de Sevilla/ es perenne su raiz rastrera, y fe. en Mayo y Junio

942. *Tetradinamia Siliculosa* /G / *Cochlearia*.

943. *Cochlearia Draba* W./ Siles. 28 de Marzo.

944. *Cochlearia*/ como *Draba*/ Madd. y Mayo 5 de 18.

945. *Cochlearia sativa*/ mayo vespere fonti / Viznagar.

946. [*Iberis semperflorens*].

947. Classis Decima quinta *Tetradinamia Ordo*/ *Siliculose*/ *Yberis Semper-florens*/ Linneo pr. Palau tº. 5º. pª. 49 / *Yberide* siempre en flor (bulgo) / Carraspique —en Cordoba mi-/rabeles de flor./ *Yberis semper-florens*/ Cabanilles Descriptio plantar. / pagª. 414 plant. 937= Este sabio/ y Benemerito Botanico, apre-/ciado no solo de su Nacion si-/no de todas las que lo han / conocido ha colocado toda / esta Clase en su Hexan-/dria sin hacer caso/ de la diferencia de Estambres/ Se cultiva en Cordova/ en muchos jardines pr. la mul-/tiplicidad de sus flores y su / perpetua verdura.

948. *Iberis Sempervi-/ rens* / *Gibraltarica*?

949. *Iberis sempervirens*./ W./ Varietas γ.

950. *Iberis* de oja/ redonda.

951. *Iberis* / *saxatilis*/ W.

952. Dos *Iberis*/ la 1ª. *Saxatilis*.

953. *Iberis umbellata* Cava.

954. *Iberis* [tachado *saxatilis*.] *linifolia* W.

955. *Iberis linifolia*/ W.

956. *Iberis Thlapsi*.
957. *Ibris ciliata* W.
958. [*Iberis ciliata*].
959. *Iberis pinnada*.
960. *Alisum/ spinosum*.
961. *Alyssum Saxatile* W.
962. *Alisum Incanum*.
963. *Alisum/ incanum*.
964. *Alisum/ calicinum/ W.*
965. *Aliso montano*.
966. [*Alysum campestris* L.]
967. *Alyssum sinuatum/ W.*
968. *Alyssum sinuatum/ W.*
969. *Vesicaria utriculata*, Decand./ *Alyssum utriculatum* L/ C
in R H M.
970. *Alisum/ serpyllifolium/ W.*
971. *Alysum/ Atlanticum* W. [tachado maritimum].
972. *Clypeola Jonthaspi*. W./ 20 de Marzo Siles.
973. *Clypeola (Maritima) perennis/ siliculis bilocularibus ova-*
tis dis-/permis. P. Bot. de Lin. pr. P. tº. 5º. 66 / *Alysson maritimum*
T. Inst./ R. Herv. 217. Fl. Esp. tº. 2º. pag. 277./ *Thlaspi Cemtunculi*
angusto fo-/lio. Lobel. Icon, 215./ Esta especie se cria en los Mu-/ros
viejos, y Muralla de la Mari-/na de Barcelona, y en otros lugares/ de
ambos Mares, y tambien en ls./ laderas del Piul de Ribas, y en la/
Marina de Ayamonte, en Andalu-/cia entre las piedras. Quer./ Coji
este esqueleto en el Jn. de Sª.
974. *Clypeola maritima*.
975. *Biscutela auriculata/W.*
976. [*Biscutela Auriculata*].
977. *Biscutella (auriculata) calycibus/ nectario untrinque gibbis,*
silicu-/lis in stylum coeuntibus. Pract. B./ de Lin. pr. Palau tº. 5º.
pag. 70./ *Thlaspidium hirtum*, calyce/ floris auriculato. T. Inst. R. H./
214. Flora Española tº. 6º. p. 374./ Esta planta se cria en muchs./
partes del circuito de Cordoba en/ tierras de labor, como en las im-/
mediatas al caño Bazan, en las/ que median entre la Victoria y/ la
Alameda y otras. Es yerba/ anual y florece en Abril.
978. *Biscutela /lirata* W.
979. *Biscutela levigata [tachado Thaderiana] / [tachado sp. no-*
va]. W. /nisi sit varietas laevigatae.

980. [Tlaspi campestre].
981. Lunaria/ annua W./ cultivada.
982. Binunias Kakile /Cabrera.
983. Crambe hispanica/W.
984. Cardamine hirsuta.
985. Nasturtium/ Aquaticum/ Vulgo berros/ Cabrera. [Otra etiqueta dice]: Merece observarse / esta planta conocida/ con el nombre de Berraza/ en Cordoba.
986. Sisimbrium Polyceratum. Cav.
987. [Sisymbrium catholicum].
988. Erisimo/ oficinale.
989. Erisimum precox/W.
990. Class. XV Tetradinamia/ Erisimum vulgare.
991. Erisimum hieracifolium. W./ 15/ tetradinamia.
992. Cheiranto /alpino.
993. *Cheiranthus* (Cheiri) foliis lanceolatis/ acutis glabris, ramis angulatis, caule fruticoso. Pract. B. de Lin. pr Palau. tº. 5º. pª. 122./ *Leucoium* luteum vulgare. T. Inst./ R. H. 221. Flora Española tom, 5º. pag. 329./ *Leucoium* luteum. Dod. pempt. 160./ *Leucoium*. Lag. in Diosc. 352./ *Leucoium* aureum. C. Bauhin. com./ Matthiol. sup. Diosc. 632./ vulgo: Aleli pajizo ó amarillo./ Esta planta se cria en las peñas de/ la costa del mar, y en los muros de Cata-luña. Se cultiva en los Jardines, y casas/ particulares de Cordoba: es perenne y flo-rece por Abril y Mayo: crece de tres á qu-atro pies: suele variar con la flor doble.
994. *Cheiranthus* Chius.
995. Class. XV Tetradinamia Ord Siliquosa/ *Cheiranthus* Incanus/ Linn. tom. 5º. pagª. 125 /Cheiranto Blanquecino (vulgo) Alheli.
996. *Cheiranthus*/tristis.
997. [*Cheiranthus* tristis].
998. [tachado *Dentaria*?] L. 2º./ Es un *Cheiranthus* /*Erisimum* angustifolium/W./9 de Julio /Canbron.
999. *Cheiranthus* contortuplicatus/W.
1000. *Hesperis* *Cheiranthus* Sp. N./ Cabrera. [Falta el ejemplar].
1001. *Arabis* thaliana Cava./ Apesar de no tener mas / que 4 estambres y no /indicarse la anomalia en Lineo/ me parece es esta especie.
1002. *Arabis* con oja/ de margarita

1003. [Turritis glabra].
1004. Turritis alpina.
1005. Turritis' species nova.
1006. Brassica Arvensis, L.
1007. Brassica Arvensis.
1008. 16. H./ Brassica arvensis/ Lin./ cheirantus amplexi-/cau-
lis Lag.
1009. Brassica alpina.
1010. Brassica Pinatifida W./ [tachado]: Eruca Grandiflora
Cavs / Brassica Eruca L.]
1011. Brassica/ pinnatifida/W.
1012. Sinapis Arvensis. L.
1013. *Sinapis* (arvensis) siliquis multangulis toroso-turgi/disros-
tro ancipite longioribus. P. B. de L. pr. P. tº. 5º. pag. 158 / *Rapha-
nistrum* segetum, flore luteo, vel palido. T./ Inst. R. Herb. 230. Flora
Española tº. 6º. pag. 178./ Esta especie se cria en las margenes de
las tierras de / labor del circuito de Cordoba./ Es annua y florece
en los meses de Abril y Ma-/yo, la llaman vulgarmente como á las
demás Xara-/mago.
1014. Sinapis alba/W.
1015. Sinapis eruroides.
1016. Sinapis eruroides.
1017. Sinapis hispanica.
1018. Sinapis Hispanica. L.
1019. Sinapis radicata/W./ an virgata Cabanilles?
1020. Raphanus/ eruroides.
1021. Tetradymania. Siliquosa./ G / Cleome./ *Cleome* (Penta-
phylla) floribus gy-/nandris, foliis quinatis, caule in-/ermi. P. B. de
Lin. pr. Pal. tº. 5º. 169 / Habita en las Indias. Pal. loc. cit./ Es planta
annua./ Vi esta especie cultibada en/ el Jardin Botanico de Sevilla
en/ Septiembre de mil setecientos noben-/ta y tres; donde coxi este
esqueleto.
1022. Cleome violacea L/ Entrena.
1023. Cleome violacea /W
1024. Cleome Violacea/Lin Cabrera.
1025. Clasis Decima-quarta, Ordo/Siliquosa/Cleome Violacea/
Linneo pr. Palau tº. 5º. / p.ª 175 Cleome violada se/ cogio en la Sie-
rra de Cordova/ en Junº. de 1817 Linneo la circunscribe a Portugal.

CLASE XVI

1026. *Pelargonium Capitatum*/ Cavs / Entrena.
1027. *Geranium odoratisimum*.
1028. Class XVI Monadelphia Ordo / Decandria/ *Geranium Odoratisimum*/ Linn Tom. 5º. Pagª. 215/ Geranio muy oloroso.
1029. *Geranium/ cicutarium*.
1030. *Erodium/ Cicutarium/W*.
1031. *Geranium Malacoides*.
1032. *Geranium Pyrenaicum* L./ vars. flore albo./ C in R H M.
1033. *Geranium [tachado Columbinum] / W./ tuberosum*.
1034. *Geranium robertianum/W*.
1035. Class. Decima-sexta Monadelphia Ordo/ Decandria/ *Geranium Robertia/ num*= Linneo pr. Palau/ tº. Vº. pª. 235= Geranio/ de Rovertio./ Se cria entre los/ empedrados y paredes/ de Cordova y en toda / su campiña; este/ Esqueleto lo cogi en/ Sn. Agustin. /Vir- tudes/ Es planta anodina/ expelente vulneraria/ y qe. retira la leche &ª.
1036. *Geranium* (Robertianum) pedunculis bifloris / calycibus pilosis decemangulatis. Pract. Bot. de/ Lin. pr. Pal. tº 5º. pag. 235./ *Geranium Robertianum primum*. T. Inst./ R H. 268. Quer Flora Espª. tº. 5º. pag. 158./ *Geranium primum*. Lag. 347. =IV. C. B. com. 622./ Se cria en Cordoba en Bosques humedos de la sierra/ y se halla en el arroyo Pedroches: es annua fe. en Abril.
1037. Geranio mancha-/do.
1038. *Geranium lucidum*.
1039. *Geranium lucidum/ pulcra varietas/ colore purpureo totius plantae*.
1040. *Geranium lucidum/ W*.
1041. *Geranium Mole*.
1042. *Geranium molle/ W*.
1043. *Geranium / Carolinianum / W*.
1044. *Erodium / praecox*.
1045. *Geranium/ Aconitifolium/ [tachado silvaticum] / W*.
1046. [Geranii sp.]
1047. [Geranii species.]
1048. *Sida* (Abutilon) foliis subro-/ tundo-cordatis indivisis, pe- dun-/culis folio brevioribus, capsulis/ multifocularibus, corniculis bi-/ fidis. Lin. Sp. P. pr. pu. tº. 5º. 264./ Abutilon. Dod. pempt. 656.

et/ Tourn. Inst. R. Herb. 99. Flora Español-/la tomo 2º. pª 152./ Esta planta habita en las Indias,/ en Suecia y Siberia. L. es annual, flore-/ce por Julio y Agosto / En Cordoba la he cultivado yo: produ-/ce el tallo sencillo y crece á la altura de/ tres ó quatro pies.

1049. *Sida disticha* Cav / C in R H M.

1050. *Sida Dilleniana* W./ *Anoda Dilleniana* Caban.

1051. *Althea Officinalis*.

1052. *Althaea Cannabina*.

1053. *Althea Cannabina*.

1054. *Althea hirsuta*/ W.

1055. *Althea hirsuta*/ W.

1056. *Althea*/ de oja aspera.

1057. *Alcea* (Rosea) foliis sinuato-an-/ gulosis. Pract. B. de L. pr. P. tº. 5º. 273./ *Malva rosea*, folio subrotun-/do. T. I. R. H. 94 F. E. tº. 5º. pª. 395./ *Malva hortensis*. Dod. pempt./ 652./ *Malva Rosea* flore pleno. C./ B. commet. Mat. sup. Diosc. pª. 359./ *Malva Rosea duplex purpurea* / Swert. et *Rosa malvea* ejusdem. flo-/rileg. lib. 2º. fol. 36./ Estas dos que pone por especi-/es distintas Swertio, y el sinonimo/ precedente pertenecen á las Varie-/dades de esta especie, cuyo numero/ es mui crecido. En Cordoba se cul-/tiban en los Jardines, y casas par-/ticulares hasta diez ó doze dellas/ por su asombrosa plenitud, y rara/ belleza de coloridos, pues las hai/ de color de fuego, carmesies, blancas,/ color de Rosa, pajizas, Anteadas,/ Jaspeadas de carmesi y blanco, de/ color de cobre sumamente oscuras/ que parecen casi negras, y de to-/dos estos colores en diversas gradu-/aciones. Son sus Raices pe-/rennes, florecen por Mayo, Ju-/nio, y Julio, crecen hasta tres/ varas de alto: las llaman Vulgar-/mente *Malvaslocas*.

1058. *Malva Spicata* L./ C in R H M.

1059. *Malva silvestre*.

1060. *Malva Hispanica*. C.

1061. *Malva hispanica*.

1062. *Malva Hispanica*/ Entrena

1063. *Malvae species*.

1064. *Lavatera Arvorecens*/ *Malva arborea*.

1065. *Lavatara olvia*/ Cabrera.

1066. *Labatera trimestris*.

1067. *Lavatera trimestris*. variets α . L.

1068. Class. XVI Monadelphia Ord. Poliandria/ Lavathera Trimestris/ Linn. Tom. 5º. pag.^a 293/ Lavatera Tremesina.

1069. Anoda acerifolia. cav.

1070. Hibiscus siriacus (cavans.)

1071. *Hibiscus* (Syriacus) foliis cune-/iformi-ovatis superne inciso-ser-/rañis, caule arboreo. Pract. Bot./ de Lin. pr. Palau tº. 5º. pag. 309./ *Ketmia* Syrorum quibus-/ dam. T. I. R. H. 99. F. E. tº. 5º. 291./ Habita en Siria y Carniola. P./ Crece como arbol, se culti-/ ba en varias partes de España:/ lo vi en 1793 en el Jardin de Sn./ Francisco casa grande de Sevilla/ en donde coxi este esqueleto./ florece en Agosto y Septiembre.

1072. *Hibiscus* (Trionum) foliis triparti-/tis incisis, calycibus inflatis. Pract./ Bot. de Lin. pr. Palau tº. 5º. pag. 318./ *Ketmia* vesicaria, vulgaris. T./ Inst. R. H. 101. Flora Esp. tº. 5º. 290./ *Alcea* vesicaria C. B. P. 317./ Dod. pempt. 657./ *Hypecoum*. Casp. Bauhin / com. Mat. sup. Diosc. 7 49 Lag. 416./ Se cria esta planta en España/ cerca de Barcelona, en el sitio que/ llaman la Granota. Quer / Crece de pie y medio: florece en/ Mayo y Junio. es annua/ Traxe este esqueleto de Sevilla/ año de 1793.

CLASE XVII

1073. Diadelphia. Hexandria./ G. / Fumaria./ Fumaria. Enneaphilla.

1074. Fumaria officinalis. L.

1075. Fumaria oficinalis.

1076. Fumaria Capreolata W.

1077. *Fumaria* (Spicata) pericarpiis mo-/nospermis spicatis, caule erecto, foliolis/ filiformibus. Pract. Bot. de Lin. por/ Palau tº. 5º. pag. 354./ Fumaria minor, tenuifolia, cau-/liculis surrectis, flore hilari purpu-/ra rubente. T. I. R. H. 422. Flora Es-/pañola tº. 5º. pag. 137./ Se cria esta planta en las mar-/genes de los campos de labor del cir-/cuito de Cordoba: en annua y flo-/rece en los meses de Abril y Mayo.

1078. Fumaria Spicata. L.

1079. Fumaria Parviflora. W./ F. spicata varietas β L.

1080. Fumaria/ [tachado longifolia] / Grassifolia.

1081. Fumaria/ crassifolia W./ Castillo de Segura/ en las rocas 3 de Abril.

1082. *Fumaria* ¿specie Nova?
1083. *Polygala amara* [tachado lupulina] / W. / [varietas flore coeruleo tachado]
1084. *Poligala amarga*.
1085. 3/*Polygala vulgaris*/17. H.
1086. *Polygala vulgaris* [tachado monspeliaca] / W.
1087. *Polygala* [tachado Senega? vulgaris] / Casas de la Nogueira / 16 de Junio 1812. / *Polygala amara* / segun la Gasca.
1088. *Polygala vulgaris*. L.
1089. *Polygala monspeliaca*/W.
1090. *Poligala de Montpellier*.
1091. *Poligala?* /Monspelia /de Lagasca/ C. de Amo. 21 de Julio.
1092. *Polygala maior*/W.
1093. *Polygala rosea*/W.
1094. *Polygala extraxilaris*./Sp. nova. de Lagasca.
1095. *Polygala/extraxilaris* /Lagasca.
1096. *Poligala*.
1097. *Spartium Junceum*.
1098. *Spartium* [tachado horridum] /W/ Scorpius?
1099. *Spartium* /angulatum.
1100. *Spartium Patens*. L.
1101. *Spartium* /Scoparium /W.
1102. *Spartium*/ Scoparium /Cabrera.
1103. *Spartium spinosum*.
1104. *Spartium?* [Otra etiqueta dice]: 10 *Spartium* H.
1105. 49. C./ *Spartium*/ vide. Desf.
1106. *Genista tridentata* L.
1107. *Genista* /tinctoria.
1108. *Genista tinctoria*.
1109. *Genista* /tinctoria /W.
1110. *Genista Tinctoria* / Palau t. 5. p. 406. [Otra etiqueta dice]: *Genista florida*. L. /Entrena.
1111. *Atoliaga Genista* /hispanica? / cada flor tiene 3 bracteads/ que parecen formar un caliz / exterior / antes me parecio /*Spartium spinosum*.
1112. *Genista lusitanica*
1113. *Genista lusitanica?*/ W.
1114. *Genista lusitanica*/ parvo flore Luteo. /T. 643./ Clase 22./ Seccion primera.

1115. [Sarothamnus].
1116. *Ulex europaeus*/ vulgo-Aulaga.
1117. *Amorfa fruticosa*.
1118. Clas. XVII Diadelphia ord Decandria/ *Amorpha Fruticosa* /Linneo Tomo V Pag^a. 427/*Amorpha Fruticosa*.
1119. *Ononis*? 45. H./repens/Peña del Cambron 9 Julio/en Siles. [Otra etiqueta dice]: *Ononis Repens* L. Entrena.
1120. *Ononis Pubescens*. L.
1121. *Ononis* / pubescens/W.
1122. 49 / L./ *Ononis* ¿pubescens? [Otra etiqueta dice]: ¿*Ononis* *Cenisia*? / Entrena/ La pubescens es vellosa.
1123. *Ononis viscosa* Cabrera.
1124. *Ononis aragonensis* /W.
1125. *Ononis aragonensis* /W.
1126. *Ononis Capitata* W?/ Como no lo tengo á la Vta. dudo /si sera esa especie ú otra cercana. /Observe Vmd en un exemplar / que va en fruto el torcido casi espiral /de la Legumbre: todas las señales /me parecen de *Ononis*: es planta /rarísima y se parece á una determi- nada con este nombre aunque no se la /flor de que color era.
1127. Muy Rara / *Ononis compresa*. Cavs.
1128. [*Ononis*].
1129. *Anthyllis* (*Tetraphylla*) herbacea, foliis quaterno-pinna- tis, floribus lateralibus. Pract. Bot. de Lin. pr. Palau t°. 5°. 458. / *Vulneraria* pentaphyllos T. Inst. R. Herb. 391./Quer Flora Española t°. 6°. pag. 497. / Esta planta se cria en terrenos aridos e incultos/ cerca de Cordoba, en los paredones del arroyo del moro ca-mino de la Arruyzafa, y camino de la Alameda endere-cho de la Huerta Balladares &c. Es annua, crece ten- dida, y florece en Abril y Mayo.
1130. [*Anthyllis tetraphylla*.]
1131. *Anthyllis tetrafilla* /Cabrera.
1132. *Anthyllis*/ *vulneraria* / Cabrera.
1133. *Anthyllis* /*vulneraria*/ W.
1134. *Anthyllis montana* /W.
1135. *Anthyllis montana* / 43 C./Cambron/ 9 de Julio. [Tachado *Hedysarum coronarium*].
1136. *Anthyllis Lotoides*.
1137. *Anthyllis* (*Barba-Jobis*) fruticosa, / foliis pinnatis aequali- bus tomento-/sis, floribus capitatis. Pract. Bot./ de Lin. pr. Palau t°. 5°. pag. 463./Habita en las peñas de Ita- lia, de Oriente y de España.

Pal./ Es perenne: Arbusto que cre-/ce á la altura de un hombre/poco mas ó menos, mui bonito,/ como lo vi en el Jardin Bota-/nico de Sevilla, en 1793, de donde /traxo este esqueleto.

1138. *Anthilis erinacea*.

1139. *Lupinus Angustifolius*.

1140. Clas. Decima septima Diadel-/phia Ord. Decandria=/? An Dolichos Lablab/ Linn. por Pal. tom. 5º. pagª 483/ Dolico Lablab o Fasol de exipto pr. / Tournefort. /Esta planta se cultiva en cordo/va en casi todos los jardines con/ el nombre de enredo de Fran-/cia y forman con ella vistosos/ cenadores; este Esqueleto lo tu-/be del guerto de Casa.

1141. ¿*Pisum* [tachado *Arvense*] W./ *P. Sativum*.

1142. *Pisum arvense*.

1143. *Lathirus*/ *Aphaca* /W./ *Cistus*.

1144. *Lathirus cicera*

1145. *Lathyrus Cicera*. W. [Otra etiqueta dice]: pª el herba/rio de Vmd. [Otra etiqueta]: *Citisus argenteus*/W.

1146. *Lathirus* / *Cicera* /W.

1147. *Lathirus angulatus* /W.

1148. Classis Decima septima Diadelphia/ Ordo Decandria/ *Lathirus Odoratus*?/ Linn. por P. Tom. 5. pagª. 52 / *Lathiro* Oloroso / (vulgo) /Guisante doble/ o Caracolas./ Se cultiva en casi/ todos los jardines pr./ sus ermosas flores,/ y su tallo voluble pro-/porcionado para for/mar Cenadores.

1149. *Lathyrus* (Odoratus) pendunculis bifloris, cirrhis diphyllis,/ foliolis ovato-oblongis, leguminibus hirsutis. Pract. Botanic./ de Lin. pr. Palau tom. 5º. pag. 520./ Esta planta se cultiva en Cordoba en los Jardines/ y casas particulares; con el nombre de *Caracolas*: es/ yerba anual, y florece en los meses de Mayo y Ju-/nio.

1150. *Lathyrus tingitanus*, L.

1151. *Lathirus*/ *clymenum*/W.

1152. *Lathirus pratensis* /*Lathirus*/ 13-I/ Ce 17.

1153. *Lathyrus* /*latifolius*/W.

1154. *Lathyrus* [tachado *cicera*] /*setifolius*/ Ce 17.

1155. *Lathirus*.

1156. *Lathiro*.

1157. *Vicia Craca*/W.

1158. *Vicia Cracca*.

1159. *Vicia* como *Onobrichis*/ o *Latiro* de pelo aspero.

1160. *Vicia onobrichioides* [tachado *onobrichioides* W] /an/ ¿An [tachado *tenuifolia*?].
1161. *Vicia* como /*onobrichis*.
1162. *Vicia Nissoliana*. L.
1163. *Vicia Biennis* L?/V. *Nissoliana* L.?
1164. *Vicia Sativa*. L.
1165. *Vicia Sativa* /W.
1166. *Vicia sativa*.
1167. *Vicia Lutea*. L.
1168. *Vicia Lutea* L/Entrena. [Otra etiqueta dice]: [tachado *Orob-
bus* ¿*vernus*?] 44/C./*Lathirus/Vicia* sp. n.
1169. *Vicia Hibrida* L.
1170. *Vicia Peregrina*. L.
1171. *Vicia bithynica* /W.
1172. *Vicia narbonensis*. L.
1173. *Vicia* [tachado *Pisiforme*]. W./villosa.
1174. ¿*Ervum Lens*?/ la he cojido en un pe/dazo de tierra sem-
brado/ todo de esto.
1175. *Citissus austriacus* /W.
1176. *Citissus/ argenteus* /W.
1177. *Citissus argenteus* / Palau. t. 5. pag. 554./ 52 L.
1178. *Citissus argenteus*.
1179. *Citissus argenteus*.
1180. 13 *Cytissus*? H.
1181. *Colutea (Arborecens)* arborea, foliolis/ obcordatis, P. B. de L. pr. P. tom. 5º. pag. 564./ *Colutea vesicaria*: T. Inst. R. H./ 649. Flora Española tom. 4º. pag. 398./ *Colutea*. Dod. pempt. 784. Casp / Bahuin. com. Mat. sup. Diosc. pag. 572./ Lagun. in Diosc. pag. 419./ vulgo: Espantalobos./ Se cria este Arbolito en Cordoba/ en los arro-
yos de los Lagares de Sierra/ morena, y cerca de la Ciudad se halla/
en el arroyo de Pedroches, y en el de la/ Palomera. Crece muí po-
blado de ra-/mas de seis á siete pies, se cubre de flo-/res amarillas
en la Primavera con abun^a [Reverso]: No es la *Colutea*/ *Coronilla*
Glaucula L/ Entrena. Ce 17.
1182. *Colutea arborescens*.
1183. Class XVII Diadelphia ord. Decandria/ *Colutea Arbores-
cens*/ Linn. Tomo V pag^a. 564/. *Colutea Arborescente*/ (vulgo) es-
pantalobos.

1184. *Coronilla* (Juncea) fruticosa, foliis qui-/natis ternatisque, lineari-lanceolatis/ subcarnosis obtusis. P. B. de L. pr. Palau/ tom. 5º. pª. 571./ *Coronilla* caule Genistae fungoso. Tourn. I. R. Herv. 650. Flora Espa-ñola tom 5º. pª. 5./ Se cria esta especie á una le-/gua de Cordoba, en Sierra-morena./ en territorio de los Lagares de Ca-seres/ y torre-doria. Crece este Arbusto de/ quatro pies de alto, pe-renne, florece/ en los Meses de Abril, y Mayo.

1185. *Coronilla Juncea*

1186. *Coronilla juncea*/ Palau t. 5. p. 571.

1187. *Ornithopus perpusillus* / varie.s β L.

1188. *Ornitopus Perpusillus*/ Cabrera/ S. Lucar.

1189. *Ornithopus compresus*.

1190. *Ornitopus Compresus*. L.

1191. *Ornitopus* /Cabrera.

1192. *Lathiro* de pelo/ aspero.

1193. *Lathiro* de hoja ancha.

1194. *Lathirus*/ de ojas varias?

1195. *Latirus Angustifolio*/ Cabrera.

1196. *Lathyrus tenuifolio*. W./ Este lo mandé con/ otro nombre especifico/ y lo he corregido pr. W.

1197. *Vicia*/ amphicarpa/W/ vi la fructificacion / subterranea.

1198. *Vicia angustifolia*/W.

1199. *Coronilla* de color garzo.

1200. *Coronilla Balearica*/ Decandolle/ C in R. H M

1201. *Ornithopus* (Scorpioides) foliis ternatis subsessilibus,/ impari maximo. Pract. Bot de Lin. pr. Palau tº. 5º. pª. 579./ *Ornitho-podium* Portulacae folio T. Inst. R. H. 400./ Quer Flora Española tº. 6º. pag. 32./ *Scorpioides*. Lag. 500. C. B. com. Matth. 895./ *Scorpioides* Matthioli. Dod. pempt. 71./ Se cria en las tierras de labor del circuito de Cordo-/ba, es annua y florece en Abril y Mayo.

1202. *Ornithopus Scorpioides*. L.

1203. *Ornithopus* / Scorpioides/W.

1204. *Ornithopus scorpioides*/ Palau. t. 5. p. 579.

1205. *Hyppocrepis comosa*/ Palau t. 5. p. 582.

1206. *Hyppocrepis Unisiliculosa*/Palau. t. 5. p. 581.

1207. *Hippocrepis annua*. Lag./ [tachado Multisilicuosa].

1208. *Scorpiurus vermiculata*. L.

1209. Class XVII Diadelphia Ord. Decandria/ *Scorpiurus Muri-cata*/ Linn. Tom. 5º. pagª. 584/ Escorpiuro con puntitas.

1210. *Scorpiurus Muricata*.
1211. *Scorpiurus sulcata*.
1212. *Scorpiurus Falcata*/ Cabrera. [Otra etiqueta dice]: *Scorpioides subvillosus*/ó/ *S. Sulcata* L/ Entrena.
1213. *Scorpiurus* (subvillosa) pedunculis sub-/quadrifloris leguminibus extrorsum/ spinis confertis acutis. Palau. t. 5./p 585.
1214. *Hedysarum*.
1215. *Hedysarum Alpinum* [Otra etiqueta dice]: *Hedysarum Alpina*. L.
1216. *Edisarum*/ coronarium/ Sulla / Cabrera.
1217. *Hedysarum* /coronarium/W. *Onobrichis crista Galli*?/D.C.
1218. *Hedysarum* / onobrichis.
1219. *Edisarum*/ *Crista Galli*.
1220. *Galega* (officinalis) legumini-/bus strictis erectis, foliolis lan-/ceolatis striatis nudis. Pract. B./de Lin. pr. Palau tom. 5°. p^a. 633. /*Galega vulgaris*, floribus/ coeruleis. T.I.R.H. 398. F. E. t°. 5°. 143./ *Ruta capraria*. Lag. in Diosc./ 371. C. B. com. Mat. sup. Diosc. p^a. 836./ Esta planta se cria ocho leguas/ de Cordoba, en el Puerto Calatrabe-/ño, camino del Alcarrazejo, y en /Cordoba la cultiban en la Alameda/y yo. Es perenne, crece de 6 ps. fe pr. M°.
1221. *Phaca Boetica*. L.
1222. *Phaca Boetica*.
1223. *Phaca* (Boetica) caulescens erecta / pilosa, leguminibus tereti-cimbi-/formibus, Lin. Sp. P. pr. pu t°. 5°. 639./*Astragaloides Lusitanica* T.I/R.H. 399. Fl. Esp. t°. 3°. p^a. 157./ vulgo Garbanzera Garbanzuelo y/ Garbanzillo./ Esta Planta se cria en la Sie-/rra-morena de Cordoba: en los Ce-/rros montuosos entre le monte mismo/ como en el cerro de Pino-gordo, y to-/dos aquellos inmediatos: en el Lagar /de Caseres en el de Torre-doria y sus/ contornos, y demas partes de la Sierra/ es perenne y florece en Abril y Mayo.
1224. *Astragalus Cristianus* (L.) /*Phaca species mihi videtur/andebetica*?
1225. *Astragalo*/ como garbanzo.
1226. *Astragalo*/ con oja de regalicia.
1227. *Astragalus Glicifilus*.
1228. *Astragalo*/ganchoso.
1229. *Astragalus hamosus*.
1230. *Astragalus: Hamosus*. Cavs.

1231. *Astragalus hamosus*/ W.
1232. *Astragalus hamosus*.
1233. *Astragalus Boeticus* /Cabrera.
1234. *Astragalus Penta*/glotis.
1235. *Astragalus Pentaglotis*/ Palau t. 5. p. 656/45. C.
1236. *Astragalus epiglottis*. 46 /C.
1237. *Astragalus Hipoglotis*. L.
1238. *Astragalus narbonensis* /W.
1239. *Astragalus* [tachado incanus] *macrorrhizos* Cav. /Palau 5. pag. 667.
1240. *Astragalus* / *fragiformis*/W.
1241. *Biserrula pelecinus*/ W.
1242. *Biserrula pelicina*/ t. 5. p. 672 47 C.
1243. *Psoralea* (*Bituminosa*) *foliis omnibus ternatis*, *foliolis lanceolatis*, *petiolis laevibus*. *flo-/ribus capitatis*, P. B. de L. pr P. tº. 5º. pª. 676./ *Trifolium betumen redolens*. T./Inst. R. H. 405 *Flora Esp.* tº. 6º. pª. 415./ *Trifolium bituminosum*. Dodon./pempt. 566./ *Trifolium Alphastites*. Lag. 341./Casp. Bauhin. com. Mat. sup. Diosc. 608./ Esta planta se cria con mucha / abundancia en las inmediaciones de /Cordoba, como en el caño Bazan, y/ en toda aquella parte de la Arrizafa/ y tambien en la Sierra en todas par-/tes. Es pe fle. en Julio. Crece de 5, á 6 ps.
1244. *Psoralea Bituminosa*/ (Cavans)
1245. *Psoralea bituminosa* L/L/ 50.
1246. *Psoralea Bituminosa* / Mayo 22.
1247. *Psoralea* (*Glandulosa*) *foliis/omnibus ternatis*, *foliolis lanceolatis*, *petiolis scabris*, *flori-/bus spicatis*. P. B. de L. pr. P. tº. 5º. 677/ *Barbajovis triphyla*, *flo-/re ex coeruleo vario*, vulgo-/culén. Fevill. peru. 7. t. 3. F./Española tº. 3º. pª. 201 y 6º. 509 / Esta planta se cria en/ el Peru y se ha connaturali-/zado en nuestra España, se/ cultiba en Cordoba pr varios /curiosos: crece de ocho á diez/ pies en alto, flore. en Mayo, es pe. [Reverso]: *Psoralea* (*Glandulosa*) *foliis omnibus ternatis: foliolis ovato-/lanceolatis*, *spicis pedunculatis*.
1248. Class. XVII *Diadelphia* Ord *Decandria*/ *Psoralea Glandulosa?*/ Linn. Tom. Vº. pagª. 677.
1249. *Trifolium Melilotindicum* L./ Posée la legumbre de una sola se/milla, lo cual separa esta especie / de las otras de la 1.ª Division.

1250. *Trifolium* (*Melilotus officinalis*)/ leguminibus racemosis nudis disper-/mis rugosis acutis, caule erecto. Pract./ Bot. de Lin. pr. Palau tº. 5º. pag. 686./ *Melilotus* Officinarum Ger-/maniae. T. Inst. R. H. 407. Flora / Española tº. 5º. pag. 415./ *Trifolium* odoratum, seu Me-/lilotus. Dod. pempt. 567./ Esta especie es mui comun en/ las campiñas de Cordoba, y se halla/ cerca de la ciudad á orillas del Rio./ la llaman vulgarmente *trebol*: es / annua y florece en la primavera.

1251. *Trifolium repens*/ Entrena.

1252. [*Trifolium cherleri*].

1253. *Trifolium* [tachado pratense] cherleri. L.

1254. *Trifolium*/ cherlerii/ W.

1255. *Trifolium* Lapaceum L.

1256. *Trifolium angustifolium*.

1257. *Trifolium*/ angustifolium.

1258. *Trifolium* (*stellatum*) spicis pilosis ovatis, calycibus paten-/tibus, caule diffuso, foliolis obcordatis. Pract. Bot. de Lin./ por Palau tº. 5º. pag. 702 / *Trifolium* stellatum. T. Inst. R. Herb. 405./ Flora Española tº. 6º. pag. 419./ Esta especie se cria en sitios algo humedos de/ los campos de Cordoba, como el callejon de la Huerta de/ la Reyna &tc. es annua y florece en Abril y Mayo.

1259. *Trifolium scabrum*.

1260. *Trifolii* Species./spumosum.

1261. *Trifolium* species / trif resupinatum L.

1262. *Trifolium fragiferum*.

1263. *Trifolii* species./ trif. agrarium L vel/ filiforme. [Otra etiqueta]: T. Agrarium/Entrena.

1264. *Trifolium agrarium*.

1265. *Trifolii* especies/ trifol. boeticum Lag.

1266. Class. XVII Diadelphia Ord. Decandria/ *Trifolii* Species?/ Linn. Tom. 5º. pagª. 683.

1267. 3º. Emparedada/ 1 de 8bre. de 815.

1268. *Lotus siliculosus*.

1269. *Lotus* (*tetragonolobus*) leguminibus soli-/tariis membrana-ceo-quadrangulis, brac-/teis ovatis. P. B. de L. pr. P. tom. 5º. pª. 715./ *Lotus ruber*, siliqua angulosa. T./ Inst. R. H. 403. no le trae Quer F. E / Esta planta se cria en las cam-/piñas de Cordoba: la vi la primera/ vez en la Alameda donde coji semil-/la, y la he cultivado.

Es annua, y flo/rece por Mayo y Junio./ Produce los tallos de poco mas de un/ pie, numerosos, y echados en tierra.

1270. *Lotus tetragonolobus* L/ Cabrera.
1271. *Lotus Angustisimus* L.
1272. *Lotus corniculatus* vars α /L.
1273. *Lotus corniculata*/ Emparedada/ 1 de 8bre. de 1815./ 22 H.
1274. ¿*Lotus corniculatus* L./Entrena.
1275. *Lotus corniculatus*. Variet.s
1276. *Lotus* [tachado *Dorycnium*] *corniculatus* L./ 55 L.
1277. *Lotus*.
1278. Loto como Citiso.
1279. *Lotus dorycnium*.
1280. *Lotus Dorycnium*/ Lin.
1281. *Lotus Dorycnium* Lin/ 54/L.
1282. *Lotus arenarius*. Brotero/ Cabrera.
1283. *Lotus/pedunculatus*.
1284. *Lotus* [tachado *corniculatus*] *peduncularis* Cav.
1285. *Lotus siliculosus*/W.
1286. ¿*Lotus Cytisoides*? / Entrena. [Otra etiqueta dice]: *Lotus* Sp. N/ Cabrera/ 53. C.
1287. *Trigonella Monspelliaca*./ 51. L.
1288. *Medicago* (Sativa) *pedunculis racemo-/sis*, *leguminibus contortis*, *caule erecto/ glabro*. Pract. B. de L. pr. Palau t°. 5°. 734./ *Medica major, erectior, floribus/ purpurascens*. T. I. R. H. 410. Flora/ Española tom. 5°. 409./ *Medica*. Lag. in Diosc. 228./ *Medica Dioscoridis*. Casp. Ba-/uhin. comm. Mat. sup. Diosc. 415./ vulgo: Alfalfa, ó Mielga./ Esta planta se cria cerca de/ Cordoba en los Palacios de la Galiana, y/ tierra de las Canteras: crece de dos/ pies de alto, su raiz parece que es / perenne, florece en los Meses de/ Junio y Julio.
1289. *Medicago/ maritima* L./ H. Mauricio.
1290. *Medicago Maritima*/ Cabrera.
1291. *Medicago polymorpha/ v. coronata*.
1292. *Medicago polymorpha/ v. ciliaris*.
1293. *Medicago polymorpha/ v. minima*.
1294. *Medicago Polimorpha, v.s Orbicularis*.

Clasis / XVIII/ Polyadelphia/ Ordo/ Pentan-/dria

1295. *Citrus* (Aurantium) petiolis alatis, foliis acuminatis./ Pract. Bot. de Lin. pr. Palau tº. 5º. pag. 758./ *Aurantium* acrí (seu dulci) medulla, vulgare. Tourn./ Inst. R. H. 620. Flora Española tº. 3º. pag. 180./ *Aurantia* Mala. Lag. 105. C. B. com. Mat. 206./ vulgo: Naranja.=y su fruto naranjas./ Este hermoso arbol se cultiva en Cordoba, en todas/ partes generalmente; donde vegeta con la mayor lozania/ produciendo tan exquisitas naranjas que nada le envidian/ [reverso]: á las mejores: florece en Abril, y su fruto esta sazona-/do en Diciembre.

1296. *Hypericum perforatum* Linn.

1297. *Hipericum/ hirsutum?* Lag. nº. 36./ V. 3 de Julio.

1298. *Hipericum tomentosum/ Vzgr*

1299. *Hypericum tomentosum.*

1300. *Hypericum Pulchrum. L.*

CLASE XIX.

1301. *Geropogon / de pelo aspero.*

1302. *Tragopogon/ pratense.*

1303. *Tragopogon porrifolium/ vulgo salsifi. 21. H.*

1304. *Urospermum/ ventenat.*

1305. *Scorzonera Humilis.* [Otra etiqueta dice]: *Scorzonerae/ species.*

1306. *Scorzonera* (Hispanica) caule ramoso, foliis amplexi-/caulibus integris serrulatis. Pract. B. de L. pr. P tº. 6º 30/ *Scorzonera latifolia*, sinuata. T. Inst. R. H. 476./ Quer Flora Española tº. 6º. pag. 270./ Esta planta se cria en las tierras de labor, y/ haun en las que no lo son, de las Campiñas de Cor-/doba, su raiz es perenne. y florece en los meses/ de Abril y Mayo. la raiz se usa en la Medicina.

1307. *Scorzonera graminifolia.*

1308. *Scorzonera* (Graminifolia) foliis/ lineari-ensiformibus integris ca-/rinatis. P. B. de L. pr. P. tº. 6º. pª. 31./ *Scorzonera Lusitánica*, Gra-/mineo folio, flore pallide luteo. T. I. R. H. 477./ Esta planta se cria en Cor-/doba, entre el monte, de Sierra-/morena, en las inmediaciones del/ conbento de Santo Domingo de/ Scala-Coeli, del Santuario de Ntra./ Señora de Linares y otras partes/ parece ser perenne su Raiz, fle. en/ Junio y Julio.

1309. Scorzonera/ Resedifolia.
1310. Scorzonera laciniata/ W.
1311. Scorzonera?
1312. Sonchus Maritimus L.
1313. Sonchus (oleraceus) V. asper. Pract. Bot. de Lin./ pr. Par-
lau tº. 6º. pag. 41.=/ Sonchus asper, laciniatus, folio Dentis-Leonis.
T./ Inst. R. H. 474. Flora Española tº. 6º. pag. 321.=/ Sonchus asper.
Lag. 213. C. B. coment Matth / sup. Diosc. pag. 384.= Dod. pemp.
643.=/ Esta planta se cria en los campos de Cordoba, en/ varios
sitios, como en el arroyo Pedroches, la Alameda &tc./ es annua y
florece en los meses de Abril y Mayo.
1314. Sonchus/ oleraceus/ W.
1315. Sonchus / tenerrimus/ W.
1316. Class. XIX Singenesia Ordo Poligamia/ Æqualis/ Sonchus
Picrioides/ Cabanilles Descripc. de las Plant./ pagª. 538. Plant. 1142/
Scorzonera Picrioyde (vulgo) Cerraja.
1317. Sonchus angustifolius/ W.
1318. Sonchus pycroides/ W.
1319. Sonchus tingitanus pedunculis squa/mosis foliis omnibus
runcinatis amplexi/ caulibus Cabanilles p. 537./ Sonchus/ picrioides/
Lam. Lag./ 29. L.
1320. Lactuca Quercina L/ Entrena. [Otra etiqueta dice]: Lactuca
Quer cifolia/ Cabrera.
1321. Lactuca/ virosa.
1322. Lactuca perennis/ Hieracium/ glutinosum.
1323. Chondrila Juncea L.
1324. [Crepis Barbata.]
1325. Crepis rubra/ W.
1326. Crepis Rubra Lin.
1327. Crepis aspera.
1328. Andriala integrifolia L.
1329. ¿Andriala integrifolia/ Entrena.
1330. Andriala/ cheiranti/ folia/ 61/ H. [Otra etiqueta dice]: Si es
Andriala sera/ Andriala integrifolia vars α /Entrena.
1331. Andriala integrifolia (Lin.
1332. Andriala Lanata/ Cabrera.
1333. Andriala Lanata Lin
1334. Andriala.
1335. Hipocheris/ Lampiña.

1336. *Hypochoeris Radicata*/ L/ Entrena. [Otra etiqueta dice]: *Lapsana Sacinta*.

1337. *Lapsana* (*Rhagadiolus*) *calycibus fructus undique patentibus, radiis subulatis, foliis lyratis*. Pract. Bot. de Lin./ por Palau




Figura 5.^a—Portada policromada de una de las Clases

tº. 6º. pag. 119./ *Rhagadiolus Lampsanae* foliis. T. Inst. R. H. cor./ 36. Flora Española tº. 6º. pag. 195./ Esta especie se cria entre los sembrados del circui-to de Cordoba: es annua y florece en los meses de /Marzo y Abril.

1338. [*Lapsana*?]

1339. *Scolymus Maculatus*./ W.

1340. *Scolymus Grandiflorus*/ W.

1341. *Scolimus* (*Hispanicus*) *floribus congestis*. Pract./ Bot. de

Lin. pr. Palau. tº. 6º. pag. 127. / *Carduus chrysanthemos*. Dod pempt. 725. / vulgo: Tagardina/ Esta planta se cria con mucha abundancia/ en las campiñas de Cordoba, se hace mucho con-/sumo de ella para comer. vive dos as fe. en el Estio. [Otra etiqueta dice]: Dudo qe. sea esta planta/ la qe. cita.

1342. *Arcium Lappa* L.

1343. *Serratula amarga*.

1344. *Serratula* /como centaurea.

1345. *Cnicus Palustris*. W./ *Cardus Palustris* (Lin.)

1346. *Cardus Picnocephalus*. L?/ *C Palustris* L.?

1347. *Carduus*, *Ciriacus*/ *Cabrera*.

1348. *Cardus Marianus*. W.

1349. *Cardus Siriacus*. L.

1350. *Cardus Siriacus*. L /vars. *Purpurea*.

1351. *Cardus Eriophorus*/ L.

1352. [*Carduus*].

1353. *Carduus*.

1354. *Cnicus Acarna* Lin.

1355. *Onopordum* sp. nov.? /W /Es especie nueva.

1356. ¿*Acarna Macrophylla*?/ ¿*Onopordum* S. N?

1357. *Carlina Acaulis*/ W.

1358. *Carlina vulgaris* L. [Otra etiqueta dice]: *Carlina vulgaris*/ remito este exemplar con/flor y la *Acarna Gumifera*/ W / *Atractylis Gumifera* de L.

1359. *Carlina* [tachado corimbosa] L./ *suphurea* W./ Cardillo de la Ubas.

1360. *Atractylis cancelata*. L.

1361. *Atractylis*/ *cancelata*.

1362. *Carthamus Lanatus*./ W.

1363. *Carthamus Coeruleus*. L.

1364. *Carthamus Coeruleus*.

1365. *Bidens* (Fron-dosa) foliis pinna-/tis serratis lineatis glabris, se-/minibus erectis. calycibus fron-/dosis, caule laevi. Pract. Bot. de/ Lin. pr. Palau tº. 6.º pag. 203. / *Varietas calycibus non foliosis*./ Esta planta vi cultibada en/ el Jardin Botanico de Sevilla/ en sep-tiembre de 1793. en don-/de cogi este esqueleto./ Es annua, y parece que/ es estrangera, AMericana.

1366. *Bidens Fron-dosa*. L/ No he podido encontrar las ojos

mas/ bajas de la Planta que creo recordar son/ de tres hojuelas; las tengo encargadas.

1367. *Dahlia pinnata*/ W.

1368. *Cacalia sonchifolia*. L / *Cacalia Coccinea* curt.

1369. Me parece Eupatorio/ Eupatorio Canabinum./ lo cogi en Guadalimar/ en una vega amena/ de sus orillas.

1370. *Eupatorium Micranthum* Lag^a / *Regali Hortu Matrit.*/ C in R. H. M.

1371. *Eupatorium secundiflorum* Lag^a./ C in R H M.

1372. *Santolina* (*Chamaecyparissus*) *pedunculis uni-/floris, foliis quadrifariam dentatis*. Pract. Bot. de/ Lin. pr. Palau t^o. 6^o. pag. 257.=/*Santolina foliis teretibus* T. Inst R. H. 460./ *Quer Flora Española* t^o. 6^o. pag. 251.=/*Abrotnum femina*. Lag 282 =/ Esta planta se cria en España, y se cultiba en Cor/doba formando dibuxos en los Jardines. es pe. fe. en A^o.

1373. *Santolina chamaeciparissus*.

1374. *Santolina Anthemoides*/ Lin./ C in R H M.

1375. Cabrera / *Atanasia Maritima* / la cogi en las playas /de Regla 1813.

1376. *Balsamita Multifida*/ Clemente/ Cabrera. [Otra etiqueta dice]: *Balsamita multifida*/ de Clemente/ Asi la nombra/Hemeler.

1377. *Tanacetum* (*Balsamita*) *foliis/ovatis integris serratis*. Pract. /Bot. de Lin pr. Palau t^o. 6^o. 273 /*Tanacetum hortense, foliis et/ odore Menthae*. T. I. R. H. 461./*Flora Española* t^o. 6^o. p^a. 356./ *Balsamita major*. Dod. com./ 299.=/ *Farm. Costus hortensis.*/ *Mentha Romana* Lag. 24./ Se cria esta planta en Es-/paña en las calles de Canencia./ y en las orillas de los prados junto/ á Linares, y Alcalá de la Selva/ en Aragon. Quer.

1378. 22. L. / [tachado thimus] / *Arthemisia contra* / *Elchecia ambigua*/ W.

1379. *Arthemisia officinalis*.

1380. *Gnaphalium/sthechas* W.

1381. Class XIX Singenesia Ord. Poligamia Superflua/ *Gnaphalium Sthoeas*/ Linn. Tom. 6^o. pg^a. 297./*Gnaphalio Estacado* (vulgo) *Perpetu-/as amarillas silvestres*.

1382. *Gnafalium sthecas*/ [tachado Centaura] / No me acuerdo donde cogi/ esta variedad o nueva / especie.

1383. Class XIX Singenesia Ord Poligam.superflua /*Gnapha-*

lium Orientale/ Linn Tom. 6º. pagª 301., Gnaphalio O-/riental (vulgo) Perpetuas amarillas de/ Jardineria.

1384. Gnaphalium sthecas/ vulgo: Siemprevivas.

1385. *Gnaphalium* (Orientale) subher-/baceum, foliis lineari lanceola-/tis sessilibus, corymbo composito, / pedunculis elongatis. Pract. Bot./ de Lin. pr. Palau tº. 6º. pª. 301./ Elichrysum Orientale. T./ Inst. R. H. 453. F. E. tº. 5º. pª. 67./ vulgo siemprevivas pajizas./ Habita en Africa. Lin./ Se cultiba esta planta en / Cordoba en muchas partes; es perenne, y se propaga mui bi-/es de planía: florece por Ma-/yo y Junio.

1386. Gnaphalium/arenarium/W.

1387. Gnaphalii species /Luteoalbum./ Es comun en Calanda y otras/ partes de Aragon. [Otra etiqueta dice]: Gnaphalium Luteoalbum/ L./Entrena / Criase en la falda de / la Sierra de Cordoba.

1388. Gnaphalium/ Luteo-album/W.

1389. Gnaphalium Luteo-album/L/Entrena.

1390. Gnaphalium Luteo-album/ Entrena.

1391. Gnaphalium sthecados.

1392. Gnaphalium.

1393. Xeranthemum/ innapertum Webb: /mi amigo/ antes Centaurea.

1394. Coniza squarrosa/ Emparedada/ 1 de Bbre de 1815/20 H.

1395. Class. XIX Singen. Ord. Poligamia/ Superflua/ an Coniza Linifolia/ Nescio Linn. Tom. 6º. pagª./338. [Otra etiqueta dice]: Inula Pulicaria/Entrena.

1396. Coniza saxatilis/ Cabrera.

1397. Cryssocoma verticalis /61/L.

1398. Coniza? carecen los floscu-/los de la periferia de los 3 dientes/ Erigeron/V. 5 de Julio [Otra etiqueta dice]: Inula Viscosa/ Entrena.

1399. Erigeron viscosum L.

1400. Inula viscosa Lag./57/L./erigeron viscosum Lin.

1401. Erigeron viscosum L./ Entrena.

1402. Erigeron Graveolens (Lin).

1403. Erigeron Linifolium /ó/E. Canadensis.

1404. Erigeron / acre/W.

1405. Erigeron crispum/Pourr. Lag.

1406. Class. XIX Singenesia Ordo/Polligamia Superflua /Erigeron Hisopifolium/ Esta determinada por/ Henseler el de Malaga afi-

ciona/do a la Ciencia. No la trae /Linneo. ni Cabanilles en su descripción de las plantas.

1407. *Erigeron hisopifolium* inula.../48/H./ *Inula crispa* Entrena.

1408. *Tusilago Fasfara*/ vulgo - una de caballo

1409. *Tusilago*/Fasfara.

1410. Class. 19 Singenesia Ordo/Poligamia superflua/*Tusilago petasites*/ Linn. Tomo 6º. pag. 368/ *Tusilago petastes* (vulgo)/ sombrerera.

1411. *Senecii species*. [Otra etiqueta dice[: *Senecio vulgaris*/ Entrena.

1412. *Senecio aegyptius*/W.

1413. *Senecio silvaticus* Lin.

1414. *Senecio Erucifolius* W.

1415. *Senecium*/Jacobaea.

1416. *Senecio Jacobae* L.

1417. *Senecio Linifolius*. L

1418. Class. XIX Singenesia Ord. Polligamia super^a /*Senecii Species* ¿*Linifolium*?/ Linn Tom. 6º. pag^a. 669.

1419. *Senecium/linifolium*/40 H.

1420. *Senecium* L /62.

1421. ¿*Aster Aipinus* L?/ Entrena. [Otra etiqueta dice]: *Aster*? 46/ H/ *Inula*?/V. 8 Julio.

1422. *Aster* (chinensis) foliis ovatis angu-/latis dentatis petiolatis, calycibus ter-/minalibus patentibus foliosis. Pract./ Bot. de Lin. pr. Palau tº. 6º. p^a. 419 / *Aster Chenopodii* folio, annu-/us, flore ingenti, specioso. Dill. elth./ 38 Flora Esp. tom. 3º. p^a. 149. / vulgo Estrañías./Havita en la China? Lin./ Esta planta se cultiva en España: en Cordoba en todos los Jardines, y/ Casas particulares, por la belleza de sus / flores, pues las produce de color de Rosa/blancas, Carmesies, Azules, Moradas, y/ Jaspeadas de estos colores, otras veces los/ flosculos del disco que son dorados, se ha-/cen del color del radio, se ensanchan y/ se alargan gradualmente formando un/ copete agraciado, crece de pie y medio á / dos de alto, es annua, y florece en los /Meses Agosto y Septiembre.

1423. Class. XIX Singenesia Polligamia superfl^a/ *Aster Chinensis*/ Linn: Tom. 6º. Pagina 419/ *Aster* de la China (vulgo)/Estrañías.

1424. *Solidago Virga aurea*.

1425. *Cineraria*/ minuta W./ floribus luteis.

1426. 57/ H./ *Inula* / oculus cristi.

1427. *Inula Oculus christi*.
1428. *Inula Oculus Cristi*/Cabrera. [Otra etiqueta dice]: Me parece mas bien / *Inula Britanica* L./ Entrena
1429. *Inula Disenterica*. L.
1430. *Inula disenterica*/ Cabrera. [Otra etiqueta dice]: ¿Sera acaso?/ *Inula Pulicaria* vars α / Entrena.
1431. *Inula Pulicaria*.
1432. *Inula pulicaria* W./ 9 bre. junto a Cordoba.
1433. *Inula Hirta*. L.
1434. *Inula Hirta*?
1435. *Inula* (*crithmifolia*) foliis linea-/ribus carnosis tricuspidatis. Pract./ Bot de Lin. pr. Pal. tom. 6.^o pag 452./ *Aster maritimus*, folio tere-/ ti, craso, tridentato T. Inst R H./ 483. Flora Española. t.^o 3.^o pag. 144 / *Crithmum*. III. Casp. Bauhin./ comm. Mat. sup. Diosc. 382./ *Crithmum* *Chrysanthemum* / Dodon. pempt. 706 / Habita en los arenales del Mar/ de Barcelona y otras partes de Es-/paña. Quer. Coji este esqueleto/ en el Jardin Botanico de Sevilla.
1436. *Inula*.
1437. *Bellis perennis*.
1438. *Bellis*/ *perennis*.
1439. Class. 19 Singenesia Ordo/ poligamia superflua/ ¿*Bellis perennis*? / Linn. Tom. 6.^o pag^a. 473 / *Belis* o *Margarita Perenne*.
1440. *Bellis perennis minor*/ W.
1441. *Bellis annua*/ W./ 19 de De. sobre la/ huerta del Nacanzo.
1442. *Bela* [tachado *annua*] / pseudo-citissus.
1443. *Tagetes* (*Patula*) caule subdiviso patu-/lo. Pract. de Bot. de Lin. pr. P. t.^o 6.^o 477./ *Tagetes Indicus*, minor, simplici/ flore, sive *Caryophyllus indicus*, seve/ flos *Africanus*. T. Inst. R. Herv. 488./ Flora Española tom. 6.^o p.^a 346./ *Flos Africanus*. Dod. pempt. 255./ *Othonna*. Lag. in Diosc. 257./ *Caryophyllus Indicus* minor flore simp-/plici C. B. com. Mat. in Diosc. 469./ *Africanus* flos simplex. Swert. flo-/rileg. lib. 2.^a fol 26./ vulgo *copetes*./ Havita en Mexico. Lin./ Se cultiva en Cordoba: crece de/ tres pies mui ramosa, es annua y flo-/rece en los Meses de Junio Julio &tc.
1444. Class. XIX Singenesia Ord. Poligamia Superfl^a./ *Tagetes patula*/ Linn. Tom. 6.^o pag^a. 477./ *Tagetes* Extendida.
1445. Class. XIX Singenesia Ord. Poligamia Su-/perflua/ *Tagetes Erecta* Linn Tom. 6.^o pag^a./ 478 *Tagetes* derecha.

1446. *Tagetes* (erecta) Varietas α ./ Lin. Spec. Plant pr. pu. t.^o 6^o. fol. 478./ *Tagetes maximus*, rectus, flore maximo/ multiplicato. Tourn. Inst. R. H. 488 / *Africanus flos masimus pleno flore/ aurantio colore*. Swert. florileg. lib. 2^o f^o. 26

1447. *Zinnia* (pauciflora) floribus/ sessilibus. Pract. Bot. de Lin. pr. P./ tom. 6^o. p.^a. 482./ *Chrysogonum foliis sessilibus/ amplexicaulibus*, calycibus sessilibus/ squamosis. L. Sp. Pl. 320./ Habita en el Peru. L./ Esta planta haunque no es/ propia de Jardines de recreo; se/ suele cultivar en algunos de/ Cordoba, y algunas casas par-/ticulares. Es annua, y florece/ en Julio y Agosto.

1448. *Zinnia pauciflora/ W.*

1449. *Pectis pinnata* Lamark/ P. Multifida Ortega/ C in R H M.

1450. Class. XIX Singenesia Ord. Polig^a. Superfl^a./ *Zinnia pauciflora/ Linn. Tom. 6^o. pag^a. 482/ Zinnia de pocas Flores.*

1451. *Chrysanthemum Leucanthemum/ L./ an C. Montanum.*

1452. *Chrisanthemum/ inodorum?*

1453. Class. XIX Singenesia Ordo Poligamia/ Superflua/ An *Artemisiae species*. [Otra etiqueta dice]: *Crisantemum indicum/ Entrena.*

1454. *Crisantemum Indicum L/ Entrena.*

1455. *Chrysanthemum/ pectinatum. W.*

1456. *Chrysanthemum* (segetum) foliis amplexicaulibus, su/ perne laciniatis, inferne dentato-serratis. Pract. Bot./ de Lin. pr. Palau. t.^o. 6^o. pag. 495./ Se cria esta planta en grande abundancia en / los sembrados del circuito de Cordoba, y la llaman/ *Pericones*, igualmente que á otras especies de este Ge-/nero Es annua, y florece en Abril y Mayo.

1457. *Chrisanthemum/ segetum.*

1458. *Chrysanthemum* (Myconi) foliis ligulatis obtusis/ serratis, calycinis squamis aequalibus. Pract. Bot. de Lin./ por Palau t.^o. 6^o. pag 496 / *Chrysanthemum latifolium*. T. p. 492, no la/ trae Quer en su Flora Española./ Esta especie no es mui comun y se cria en algu-/nos parages del circuito de Cordoba en tierras de labor/ la tengo obserbada hacia el arroyo del Moro: es annua/ y florece en Abril y Mayo.

1459. *Chrisantemum/ miconii.*

1460. *Crisanthemus Myconis /Lin.*

1461. *Pyrethrum Multi/ caule. W.*

1462. *Pyrethrum* [tachado multicalue/ varietas foliis villosis W.]/ Bocconì.

1463. *Matricaria Parthenium*/ vulgo-Yerva de Sta. Maria.

1464. Class XIX Singenesia Ordo/ Poligamia Superflua/ *Matricaria Parthenium*/ Linn. Tom. 6º. pagª. 501 / *Matricaria partenio*.

1465. *Cotula Aurea*/ Cabrera.

1466. *Cotula* / aurea/ 60/ H.

1467. *Cotula Aurea* L/ Entrena. [Otra etiqueta dice]: *Cotula Anthemis*/ Cabrera.

1468. *Cotula foetida*. [Otra etiqueta dice]: Dudo qe. lo sea.

1469. *Anthemis Mixta* L./ En las calles.

1470. *Anthemis* (nobilis) foliis pinnato-compositis linearibus/ acutis subvillosis. Pract. Bot. de Lin. pr. Palau tº. 6º. pag. 521./ *Chamaemelum nobile*, sive *Leucanthemum odoratius*./ T. Inst R. H. 494. Quer Flora Española tº. 4º. pag. 177./ *Chamaemelum odoratum*. Dod. pempt. 259.=/ *Anthemis* sive *Chamaemelum*. C. B. com. Mat. 649./ Esta planta es mui comun en Cordoba en los patios de muchas casas, y en los Jardines la llaman vulgarmente *Manzanilla fina*. es annua y florece en Abril y Mayo.

1471. *Anthemis* (*Cotula*) receptaculis concis, paleis setaceis, seminibus nudis, Pract. Bot. de Lin. pr. Palau tº. 6º. pag. 523./ *Chamaemelum foetidum*. T. I. R. H. 494. F. E. tº. 4º./ pagina 179./ *Cotula alba*. Dod. pempt. 258./ Esta planta se cria en Cordoba con mucha abundancia/ en los llanos de la Albayda, en la piedra de la buena vis-ta y otros sitios, es annua y florece en febrero y Marzo.

1472. *Anthemis cotula*.

1473. *Anthemis Pyrethrum*/ Lin./ C in R. H. M

1474. *Anthemis valentina*.

1475. *Anthemis australis*/W.

1476. *Achilea* (*Ageratm*) foliis lanceolatis/ obtusis. acute serratis. Pract. Bot. de Lin. pr. Palau tº pª. 531./ *Pfarnica lutea*, suaveolens. T. I./ R. H. 497. Flo. Esp. tº. 6º. pª. 144 / *Balsamita minor*. Dod. pempt. 295./ Esta planta se cria en sierra/morena á una legua de distancia/ de Cordoba, en el Lagar de San/José y todos aquellos contornos, y/ en torrebermeja, y otros sitios. Es/ sumate. olorosa, pne. y fe. en Junio y Jº.

1477. *Achilea Millefolium*.

1478. *Achileia/millefolium*.

1479. *Achillea* olorosa.
1480. *Aquillea/microphila*/ 53. H./ C. de Amo. 20 Julio.
1481. *Achillea Microphilla*. W.
1482. 31. *Achileia*? H.
1483. *Verbesina* (alata) foliis alternis decurrentibus/ undulatis obtusis. Pract. Bot. de L. pr P. to. 6^o. p^a. 550./ Se cria en Curasao y en Suriman. Pal. loc. cit./ La he cultivado en Cordoba en mi Jardin;/ Es perenne y florece en Agosto y Septiembre/ crece de dos á tres pies de alto.
1484. *Buphtalmum/Spinosum/Cabrera*.
1485. *Buphtalmum spinosum* / (Cavans.).
1486. *Buphtalmum Spinosum*.
1487. *Buphtalmum/maritimum*?
1488. Class XIX Singenesia Ord. Polligamia/ Frustranea/ Helianthi tuberosi varietas? /Linn. Tom. 6^o. pag^a. 570. (vulgo) Patacas. [Otra etiqueta dice]: No es Heliantus.
1489. *Centaurea/ Crupina* /W.
1490. *Centaurea* / crupina/ 28 H. de la 2^a. remesa.
1491. *Centaurea saxatilis/et crupina* W.
1492. *Centaurea crupina*.
1493. *Centaurea Moschata/Entrena*.
1494. *Centaurea Alpina* L/ Entrena.
1495. *Centaurea Linifolia/Cabrera* [Otra etiqueta dice]: *Centaurea Solstitia/ lis. Cavs. /Entrena*.
1496. *Centaurea Nigra* L./ no es la C. Montana/ pues no tiene el tallo/ Alado. Entrena. [Otra etiqueta dice]: *Nigra? mihi 51./ H./ Centaurea/Montana?*
1497. Mayo 21./ *Centaurea Pullata/Lin. T. 6. f. 605*.
1498. *Centaurea montana/ Sierra de Segura-Junio-29*.
1499. 50. H./ *Centaurea* / panniculata.
1500. *Centaurea* / escabiosa.
1501. *Centaurea amara* / varietas β W.
1502. *Centaurea* / alba W.
1503. *Centaurea alba/ W*.
1504. *Centaurea Alba. L/ Entrena* [Otra etiqueta dice]: 5 C. 59. H./ (tachado centaurea) / coniza/ rupestris.
1505. *Centaurea/ babilonica*.
1506. *Arzolla/ Centaurea/ Leuzea conifera*.

1507. *Centaurea* (Conifera) calyci-/bus scarioris, foliis tomentosis/ radicalibus lanceolatis, caulinis/ pinnatifidis, caule simplici. Pr^a / Bot. de Lin pr. Palau. t^o. 6^o. p^a. 620 / *Centaurium majus*, incan-/um, humile, capite pini. T I./ R. H. 449. F. E. t^o. 4^o. p^a. 112./ Esta planta se cria en Cordo-/ba en terrenos montuosos: en las/ inmediaciones del Santuario de/ nuestra Sra. de Linares, y en los / demas parajes de la Sierra. Su ra-/iz es perenne, florece en Junio./ á esta *Centaurea* la dan tambien el nombre/ de Arzolla.

1508. *Centaurea/ benedicta/* calices con espinas dupli-/cadas lanudos y con involucrio.

1509. *Centaurea* (Benedicta) calicybus du-/plicato-spinosis lanatis involucriatis, fo-/liis semidecurrentibus denticulato-spi-/nosis. Lin Sp. Plant. pr. pu. t^o. 6^o. 624./ *Cnicus sylvestris*, hirsutior, sive/ *Carduus Benedictus*. T. p. 450. Flora/ Española tomo 4^o. p^a. 358./ *Carduus Benedictus*. Lag in Diosc./ 333 Dod. pempt. 725. Casp Bauhin./ commeut. Matthiol sup. Diosc. 594./ Farm. *Carduus benedictus*. vulgo/ *Cardo santo*./ Se cria y es comun en los mas ter-/renos de España, en Cordoba se siem-/bra, y hace mucho uso de ella en la far-/macia. de su raiz leñosa salen muchos/ tallos ramosos de dos á tres pies de largo/ reclinados é incorporados pr. lo regular./ es annua y florece pr. Junio y Julio. (Dorso): La tengo observada en la Sagra / de Toledo, en el año de 1795.

1510. *Centaurea Eriophora/ o/ Lanuda/* Palau. t^o. 6 pag 625/ 29 H. 26. C.

1511. *Centaurea Calcitrapa* L/ esta es la qe. no pudimos/ determinar el año pasado.

1512. *Centaurea Solticialis* Cava.

1513. *Centaurea Soltitialis* Cav.

1514. *Centaureae Species*. [Otra etiqueta dice]: *Centaurea Melitensis/L./* Entrena.

1515. *Centaurea Salmantica* /Lin.

1516. *Centaurea / Salmantica*.

1517. Class. XIX Singenesia Ordo /Poligamia Frustranea/ *Centaurea Salmantica/Linn*. Tom. 6^o. pag^a. 631/ *Centaurea de Salamanca/* (vulgo) Escobilla.

1518. *Centaurea Galactites* L.

1519. *Centaurea Galactites*. L.

1520. *Centaurea coerulescens/ W / virgata* Cab.

1521. *Centaurea*/ 52. H / incana/ de la Gasca/ segun / les/ Herse.
 1522. *Centaurea*.
 1523. Clas.—19—Singenesia ordo Poliga-/mia necesaria /*Calendula officinalis*./ Lin. Tomo 6º. pagna. 653/ (vulgo) Micaelas o Do-blones.
 1524. *Filago Germanica* L/ en las inmeds de Madrid.
 1525. *Filago Pyramidata* Lin/ me parece /*Gnaphalium*.
 1526. *Filago Gallica* L./ Rl Casa de Campo.
 1527. *Filago Arvensis*. L / tengo un esqueleto del/ F. Gallica del Jardin Botanico/ mui parecido á este, pero no es tan/ tomentoso y las ojas mas estrechas.
 1528. *Filago arvensis*.
 1529. *Filago Arvensis* L?/ F. Montana./ Entrena /No es el F Ger-manica. [Otra etiqueta dice]: 54. H *Filago ger/manica /arvensis* / 59. L/ *Gn. arenarium*?
 1530. *Filago pygmaea*/W/*Rabanales*/a los lados de Arrecifes.
 1531. 5/ *Micropus* sp. nova?/ L./ 14. H.
 1532. *Echinops* Rhitro.
 1533. *Jasione Montana* L/ Entrena.
 1534. *Viola canina*/W.
 1535. *Viola cornuta* W / La cogi junto al arroyo de D. Lucas./ Dia 10 de Abril de 1833.
 1536. *Viola haeterophila*/sp. nova/*stipulis brevissimis ciliatis*.
 1537. *Balsamina impatiens* L / Entrena/ *Balsamina Nolitangere*.
 1538. *Balsamita/multifida* L/ 58/ de Clemente.
 1539. *Ptarmica*.

CLASE XX.

1540. *Orchis albida*/W./ *Satirum Albidum* L?/ Esta plantita re-cuerdo que /Vmd trabajó en ella, pero/ no del resultado.
 1541. *Aristolochia* (Boetica) foliis corda-/tis acutiusculis, caule volubili, pe-/dunculis subternis petiolo longiori-/bus. Pract. B. de Lin. pr P. tº. 6º. 888./ *Aristolochia Clematitis* ser-/pens. T.I.R.H. 162. Fª. Eª. tº. 3º. 91./ Esta especie se cria con abun-/dancia en los cam-pos de Cordoba en-/rredada en los Olibos: señaladamente-/ hacia la Arrizafa y por toda la fal-/da de la sierra./ Es yerba perenne, y flo-rece / en los meses de Abril y Mayo, y ca-/si en todas las estaciones del año la/ he obserbado con flor.

1542. *Aristolochia* (*Pistolochia*) foliis cordatis crenulatis subtus re-/ticulatis petiolatis, floribus solitariis Pract. Bot. de Lin./ por Paulau tom. 6°. pag 890./ *Aristolochia Pistolochia dicta*. T. Inst. R. H 162./ Quer Flora Española tº. 3º. pag. 92.=Casp. Bauhin /com. Mat. sup. Diosc. pag. 483.=Farm. *Aristoloc. tenuis*./ Esta especie se cria cerca de Cordoba en los llanos/ de la Albayda, en la Palomera entre el monte baxo, y o-/tros sitios: es perenne y florece en los meses de Marzo y Abril.

1543. *Aristolochia longa*/W.

1544. *Aristolochia*/ *longa*. W.

1545. *Cytinus hippocistis*/W.

1546. *Cytinus hypocistis*/ Lin. t. 6. p. 901.

1547. *Ari*, *Dracunculi*/ *Filius parvulus*.

1548. *Arum Maculatum* L./ Entrena.

1549. *Arum Maculatum*. [Otra etiqueta dice]: *hisopofolium*.

1550. *Arum Arisarum*.

1551. *Arum Arisarum*.

CLASE XXI

1552. *Chara Vulgaris*.

1553. 9. *H. Chara*.

1554. 8. *H. Chara?*

1555. 5. *H. Chara*.

1556. *Carex/arenaria*/W.

1557. *Carex flava* L./ ó / *C. cespitosa* L./ Entrena.

1558. *Carex Distans*. L.

1559. *Carex vesicaria* L./ Es la especie qe mas se acer/ca; pero tal vez en W/habra otra qe mas le/ combenga.

1560. *Carex*.

1561. *Carex?*

1562. *Betula Alnus*. L/ *Alnus Glutinosa* W.

1563. *Urtica Urens*.

1564. *Urtica dioica*/ W.

1565. *Urtica/Dioica*.

1566. [Bardana menor.]

1567. *Amarantus Melancolicus*.

1568. *Amarantus*.../ *Melancolicus*—foliis ovato lanceolatis / macula nigra in medio foliorum infectus.

1569. Class XXI Monoecia Ord. Pentandr^a / *Amaranthus tricolor*/ Linn./ Tom. 7º. pag^a. 134/ Amaranto de tres colores/ (vulgo) papagayo.

1570. *Amaranthus viridis*. L.

1571. *Amaranthus viridis* W.

1572. *Glomeraria deflexa* (Cavans) / ó / *Amarantus Deflexus* Lin

1573. *Amarantus deflexus*

1574. *Amaranthus Deflexus*./ L. /Entrena.

1575. *Amaranthus deflexus*. [sic]

1576. *Amaranthus (caudatus) racemis pent-/andria decompositis cylindricis pendulis/ longissimis*. Lin. Spec. P. pr. pu. tº. 7º. p^a. 143./ *Amaranthus maximus*. Tourn. Inst. R./Herb. 224 Flora Española 2º. fol. 283./ vulgo: Moco de Pabo./ Habita en el Peru, en Persia, Zeylan/ y Rusia. L. se cultiva en Cordoba en los/ Jardines de la Alamea, y otros /Crece á la altura de cinco pies ó mas,/ y sus racimos cuelgan hasta cerca del suelo. /Es annua y florece por Agosto y Septiembre.

1577. Class. XXI Monoecia ordo/ Pentandria/ *Amaranthus Caudatus*/ Linn. Tom. 7º. pag^a 103 / Amaranto de Cola / (vulgo Moco de pavo.

1578. *Potherium Sanguisorba* Lin.

1579. *Poterium Sanguisorba*/ Cabrera.

1580. *Quercus (Ilex) foliis ovato-oblongis/ indivisis serratisque subtus incanis,/ cortice integro*. Pract. Bot. de Lin./ pr. Palau tº. 7º. pag. 167./ *Ilex oblongo, serrato folio*. T./ Inst. R. H. 583. Flora Esp^a. tº. 5º. 262 / vulgo: *Encina*./ Se cria con tanta abundancia este arbol en toda la Sier-/ra de Cordoba, que hai bosques for-/mados de el de muchisima extensin./ se halla generalmente en toda la /Sierra y muchas partes de la Cam-/piña. Vibe muchos siglos, crece de /una magnitud mui grande, y flore-/ce en Abril y Mayo.

1581. *Quercus illex/v. smilax* β / Mesto.

1582. *Quercus Aegilops*/ W./ Mesto en España. [Otra etiqueta dice]: El Fruto del Mexto, aun/ que no enteramente maduro.

1583. *Quercus* /Cerris.

1584. *Quercus Cerris* /Malojo. /W. /Sierra del agua/ Es acaso el *Q. pubescens*/ó el pirenaica de W.?

1585. *Corillus* / avellana.

1586. *Mimosa (Pudica) aculeata, foliis/ subdigitatis pinnatis*,

caule hispido / Lin. Spec. Plant. pr. pu. tº. 7º. pª. 193./ vulgo: en Cordoba Sensitiva./ havita en el Brasil./ Esta Planta se cultiva en Cordoba pr / los curiosos, en donde la dan aquel nombre/ por el prodigioso sentimiento que hace al/ tocarla: pues si sus ojas quando estan abi-/ertas se tocan ligeramente se cierran al/ instante las ojuelas parciales de las pinnas./ aproximandose estas entresi; y graduando el /toque se dobla el pezon por su base quedan-/do la Oja colgando: lo que se hace con gran-/de admiracion, y gusto del curioso especta-/dor Crecen sus tallos del largo de un pie ó mas./ declinados. Florece en Agosto y Septiembre, y/ se hiela en el invierno comunte.; haunque al-/guna vez se ha hecho perenne reserbandola/ del rigor de aquella estación.

1587. *Mimosa* /Pernanbucana.

1588. *Thuja* (Orientalis) strobilis squarrosis, squamis acutis./ Pract. Bot de Linn. por Palau tº. 7º. pag. 231 / Este Arbolito es procedente de la China y se cul-/tiba en España: en el año de 1789 por acaso hube á las/ manos unas semillas de el, sin nombre, las sembre y/ nacieron quatro que. en breve se criaron, y existen/ todos en Cordoba, uno en la Alameda del Obispo,/ otro en el Real convento de San Pablo, otro en el/ Real Colegio de la Asuncion, y otro en mi poder. [Reverso]: florece en Cordoba por Enero, y grana perfectamente/ sus semillas que estan maduras en el Estio.

1589. *Croton tinctorium*/ an sp. nova seu varietas/ Lin. t. 7. p. 246

1590. *Croton* (Tinctorium) foliis rhombeis/repandis, capsulis pendulis, caule herba-/ceo. Lin. Spec. Plant pr pu, tº. 7º. pª. 245./ *Ricinoides*, ax qua paratur Tourne-/sol Gallorum. T. I. R. H. 655. F. E. tº. 6º. 202 / *Heliotropium minus*. Diosc. pr. Lag. 500./ *Heliotropium minus*, Dod. pemp. 71./ Habita en las inmediaciones de la/ Ciudad de Cordoba: donde se cria con a-/bundancia, en los campos de labor y ha-/un en los que no lo son, como en las hazas/ del Marrubial, y en todos aquellos suelos./ La he visto tambien en la Villa de Posadas/ seis leguas de esta Ciudad. Es annua y flore /ce en Julio y Agosto.

1591. [*Ricinus communis*.]

CLASE XXII

1592. *Salix rorismarinifolia* /W. [Otra etiqueta dice]: *Salix riparia*/ W./ eadem/quae ante/ [ilegible]: le Vmd?.

1593. *Salix Viminalis* /Sauce ó Mimbrera.
1594. [*Salix*.]
1595. *Empetrum* (Album) erectum. /Pract. Bot. de L. pr. Palau tº. 7º. pª. 344./ *Empetrum Lusitanicum*, fruc-/tu albo. T. I. R. H. 579. Fl. Esp. tº. 5º. 69./ Este Arbustico se cria en Espa-/ña en las costas maritimas de Gali-/cia: donde la llaman aquellas gentes/ *Caramiñas*. vease á Quer. loco citado./ Me dio este esqueleto en Sevil-/la Don Anastasio Guzman: con/ dicho nombre generico y especifico / en Septiembre del año de 1793.
1596. *Osyris Alba*.
1597. *Viscum album*/ en los pinos junto al Hornillo.
1598. *Pistacia* (*Lentiscus*) foliis abrupte-/pinnatis, foliolis lanceolatis. Pract./ Bot. de Lin. pr. Palau tº. 7º. pª. 372./ *Lentiscus vulgaris*. T. Inst./ R. H. 580. Flora Espª. tº. 5º. pag. 323./ *Lentiscus*. Lag. 55. Dod. pempt / 281. C. B. Comm. Mat. in Diosc. 105 / Este arbusto es mui comun en/ la sierra de Cordoba por todas ps./ no obstante ser arbusto se hallan/ algunos de tronco tan grueso, y esta-/tura tan corpulenta, que puedn./ equibocarse con los mas frond-/sos Freznos. florece en Abril-
1599. *Thamnus communis*.
1600. *Tamus communis*, L./ No he encontrado la flor/ femenina ahora, pero se la/ mando, pues creo es la qe tiene /Vmd determinada con otro nombre./ es de la Ce 22 or 6º.
1601. [*Tamus communis* L.]
1602. *Smilax/nigra* W.
1603. *Mercurialis* / Anbigua/Cabrera.
1604. Planta ♂ /*Mercurialis* (annua) caule bra-/chiato, foliis glabris, floribus spica-/tis. Pract. B. de Lin. pr. Pal. tº. 7º. pª. 412./ *Mercurialis* spicata, sive foe-/mina Dioscoridis et Plinii. T. Inst./R. Herv. 534. Flora Espª. tº. 5º. pag. 432./ *Mercurialis foemina*. Lagun./ 498. C. B. com. Mat. sup. Diosc. 890./ *Mercurialis spicata* seu foemi-/na. Dod. pempt. 685./ Esta planta es demasiado co-/mun en las Huer-tas, Jardines y/ qualquier sitio humedo. Es annua/ y florece en Marzo y Abril.
1605. *Mercurialis annuae*, planta / foemina. ♀
1606. *Mercurialis* (tomentosa) caule suffruticoso. foliis to-/mentos. Pract. Bot. de Lin pr. Palau tº. 7º. pag. 412./ *Mercurialis fruticosa*, incana, spica (seu testi-/culata). T. Inst. R. H. 534. Flª. Espª.

tº. 5º. pag. 433 / *Phyllum*. Lag. 353. C B. com. Mat. 634/. Esta especie se cria en Cordoba, en las tierras de la / isla que, formo el Rio mas arriba de Lope-garcia, qu-/ando dexo aquel molino en seco: Es perenne y flore/ce en los meses de febrero y Marzo.

1607. *Mercurialis*/ tomentosa.

1608. *Mercurialis*/ tomentosa W.

1609. *Schinus* Molle L / C in H R M. [Otra etiqueta dice]: *Schinus* Areira L./ *Schinus* Molle variets β. W./ Siento que el tiempo no le permita/ herborizar despacio, yo tampoco hago nada,/ y la prueba es que he tenido que entretener/me con las plantas de las cercanias. como la/ sigte que es de su huerto y he aprovechado su/ estado de fructificacion. Entrena.

1610. *Schinus* (Areira) foliis pinnatis,/ foliolis integerrimis aequalibus, petio-/lis aequalibus. Lin. Sp. P. pr. pu. tº. 7. 420./ *Lentiscus* Peruviana. Caspar Bahu-/hinus in comentar. Mathiol. super Dioscorid. 107 / Este Arbol habita en el Brasil y en / el Peru. Se cultiva en Cordoba en la Ala-/mea, y en el Ospital del Cardenal, se conoce/ vulgarmente con el nombre de falsa-pimi-/enta; aunque no es, el *Molle*, á quien se da es-/te nombre./ Es de un aspecto agradable. Cortandole al-/guna rama ó hiriendole suda inmediatamte./ un licor lacteo pegajoso, que se condensa en/ resina mui blanca de la figura y color de los/ mocos de cera, la que pasado algun tiempo se po-/ne azulada, quemada huele al modo del In-/cienso./ Florece en el Otoño.

1611. *Coriaria*/ mirthifolia W./ Redor/ para tenir negro.

1612. *Sabina*/ *Juniperus*/ *Sabina* W. [Otra etiqueta dice]: *Juniperus* (Sabina) foliis oppositis/ erectis decurrentibus, oppositionibus/ pyxidatis. P. B. de L. pr. Palau tº. 7º. 439./ *Sabina* folio Tamarisci, Dioscori-/dis. Quer Flora Española tº. 6º. 229./ *Sabina* baccifera. Casp. Bauh./ commet Mat. sup. Diosc. 120./ *Sabina*. Lagun. in Diosc. 63. Do-/don. pempt. 854./ Se cria este Arbol en varias partes de España, como en los cerros del / pinar de la Cartuxa del Pualar de/ Segovia, en Bustarviejo. &tc. Quer./ Traje este esqueleto de Sevi-/lla en el mes de Septiembre del / año de 1793. me lo dio Guzman.

1613. *Juniperus*/ comunis W.

1614. *Juniperus* (communis) foliis ter-/nis patentibus mucronatis, bacca / longioribus. Pract. Botan. de Lin./pr. Palau tº. 7º. pª. 441./

Juniperus vulgaris, fruticosa./ T. Inst. R. H. 588 F. E. tº. 5º. pª. 284./ *Juniperus*. Lag. in Diosc. 62./ Dodon. pempt. 852. C. B. commet./ Matthiol. sup. Diosc. 118./ Se cria esta especie de Enebro/ en Cordoba en Sierra-morena, en/ aquel paraje que llaman los Arena-/les camino de Villaviciosa. Crece/ no mui alto este Arbusto; pero mui/ ramoso, florece en Mayo y Junio./ Se hace mucho uso de su madera/ en Cordoba para cucharas.

1615. [*Juniperus/ phoenicea* L.]

1616. Andrinales - Alcaraz 16 de Marzo/ tejo - Arbol robusto = hoja mui/ preciosa flor como la del Enebro/ madera apreciable/ planta dañosa á animales y plantas/ *Taxus baccata*.

1617. Cheilantes/ odora W. [Otra etiqueta dice]: 19 H./ 4/ *Pteris fragans*./ An. de Ciencias Nat./ nº. 14. [Una nota dice]: Tengo el honor de presentar a V. unas hojitas secas del Cheilantes/ odora de W. Genero formado por el Swartz con algunas especies del/ *Adiantum* del qe. se distingue por la escamita qe. con el reborde de la hoja/ concurre á cubrir la fructificacion. Va tambien un exemplar fresco/ sobre el qual no estoi tan seguro: aunque quiza V. observando/ con mejores lentes uno y otro me enmendara la plana. Del/ fresco si V. lo determina se servira ponerme dos ó tres frondes/ para mi herbario porque no me he quedado con ninguno.

1618. [*Polypodium vulgare* L.]

BIBLIOGRAFÍA

- González Román, Gonzalo, (Saravia, 3. Córdoba). 1953: «Biografía del Padre Muñoz Capilla». Premiado en el Concurso del Centenario del Círculo de la Amistad. (Inédito).
- González Soriano, Antonio. 1923: Flora de Córdoba: «Bol. R. Acad. Córdoba» 2 (3): 93-95; (4): 93-99; (5): 49-59; y (6): 77-83.
- Laza Palacios, Modesto. 1943-1944: Estudios sobre la Flora Andaluza. «An. R. Acad. Farmacia» (Madrid) 10 (2): 157-199; 367-411; y 497. (En las páginas 157-162 incluye datos de gran interés sobre Muñoz Capilla y sus amigos botánicos. En las páginas 167-188 publica varias de sus cartas).
- Ramírez de Arellano, R. 1923: «Ensayo de un catálogo biográfico de escritores de la provincia y diócesis de Córdoba, con descripción de sus obras. Tomo 1: 416-420. Tipografía de la «Rev. de Archivos, Bibliotecas y Museos», Madrid.

PRINCIPALES ERRATAS

| PAGINA | LINEA | DICE | DEBE DECIR |
|--------|--------|-----------------------|---|
| 191 | 8 | año 1790 | año de 1790 |
| 191 | 31 | Lingustrum | Ligustrum |
| 196 | 17 | casa donde | casa de donde |
| 203 | 29 | ἐγὶ | ἐπί |
| 207 | 28 | ample-/ xicalibus | ample-/ xicaulibus |
| 209 | 1 | (Europae) | (Europaea) |
| 212 | 17 | dems | demas |
| 213 | 3 | Tour | Tourn |
| 213 | 3 | 244 | 224 |
| 213 | Última | eu | en |
| 214 | 4 | Monogina | Monoginia |
| 214 | 32 | Ramus | Ramnus |
| 214 | 33 | Ramus | Ramnus |
| 215 | 6 | Romnus | Ramnus |
| 216 | 6 | su tom. | au tom. |
| 217 | 9 | Dioc. | Diosc. |
| 218 | 1 | pelambres | Pelambres |
| 218 | 18 | ample-/ xicalibus | ample-/ xicaulibus |
| 218 | 30 | annum | anuum |
| 219 | 4 | ex frutex | frutex |
| 220 | 28 | 505 | 405 |
| 223 | 31 | Narcisus | Narcissus |
| 226 | 5 | Fueute | Fuente |
| 227 | 37 | Heptandria. Monogynia | (Debe pasar detrás de la línea siguiente, antes de 516) |
| 228 | 29 | ð | ð |
| 232 | 29 | Dianthtus | Dianthus |
| 232 | 31 | blau- | blan- |
| 233 | 6 | Diauthus | Dianthus |
| 234 | 17 | vnlgo | vulgo |
| 234 | 34 | luteu | luteum |
| 241 | 11 | variet, α | Variet, α |
| 241 | 38 | acre | acre y |
| 247 | 4 | Ton. | Tom. |
| 253 | Última | Biscutela | Biscutella |
| 258 | 13 | toroso-turgi/disros- | toroso-turgi/dis ros- |
| 261 | 31 | en annua | es annua |
| 271 | 34 | conbento | combento |
| 272 | 12 | oleraceus | oleraceus |
| 274 | 29 | Lanutus | Lanatus |
| 276 | 22 | Bbre | 8bre |
| 277 | 15 | Jacobae | Jacobaea |
| 277 | 21 | Aipinus | Alpinus |
| 280 | 30 | (Ageratm) | (Ageratum) |
| 282 | 1 | scarioris | scariosis |
| 282 | 16 | commeut. | comment. |
| 284 | 15 | hisopofolium | hisopifolium |